

S P I S Y
VYDÁVANÉ
PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU
MASARYKOVY UNIVERSITY
REDAKTOR
BOHUSLAV HOSTINSKÝ

PUBLICATIONS
DE LA
FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK
RÉDIGÉES PAR


ROK 1926

Čís. 70

ITER TURCICO-PERSICUM
PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO
PARS III

SCRIPSIT

DR. FR. NÁBĚLEK



VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ

KNIHKUPECTVÍ A. PIŠA, BRNO, ČESKÁ 28

|

EN VENTE CHEZ

S P I S Y
VYDÁVANÉ
PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU
MASARYKOVY UNIVERSITY
REDAKTOR
BOHUSLAV HOSTINSKÝ

PUBLICATIONS
DE LA
FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK
RÉDIGÉES PAR

Rok 1926

Čís. 70

ITER TURCICO-PERSICUM

PARS III

PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO

SCRIPSIT

DR. FR. NÁBĚLEK

VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ | EN VENTE CHEZ
KNIHKUPECTVÍ A. PIŠA, BRNO, ČESKÁ 28

TISKEM POLYGRAFIE V BRNĚ.

ITER TURCICO-PERSICUM.
PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO.

PARS III.

[Pars I.: harum Publicationum Nr. 35, pars II. Nr. 52.]

Campanulaceae.

Michauxia nuda A. DC. Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Maltau prope pagum Tell-Kef (Tell-is-Kof) dit. Môşul, ad rupes calcar. alt. ca. 600 m. 6. VI. 1910 (No. 2149).

Campanula sclerotricha Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiali: ad pagum Čerme in valle fluvii Zab inter pagos Baškala et Kočānes, inter frutices ad fontem alt. ca. 1300 m. 5. IX. 1910 (No. 2139).

Campanula Bornmülleri Nábělek sp. nova. [Pag. 5, fig. 1, tab. II, fig. 3]. Grex Scapiflorae Boiss. *Rhizoma ramosum, cespitosum, in rupium fissuras descendens, fuscum, inferne tenue, sursum foliorum emarginatorum basibus persistentibus incrassatum, foliorum rosula terminalis. Folia obovata vel obovato-spathulata, apice rotundata vel subtruncata, basin in petiolum angustum cuneato-attenuata, a medio remote sursum crenato-dentata, crassiuncta, plana, nervo unico infra parum prominente percursa, brevissime puberula, griseo-viridia, exteriora interioribus plus duplo minora, maxima cum petiolo usque 3 cm longa et 6—8 mm lata. Caules floriferi extrarosulares, scapiformes, plerumque uniflori, rarius 2—3-flori, humiles, patule hirsuti, florendi tempore 2—3 cm longi, fructiferi usque 5 cm attingentes, erecto-ascendentes, foliosi, folia 5—6, sessilia, obovata, ad apicem denticulis paucis sursum crenato-dentata, intermedia maxima 5—7 mm longa et 2—3 mm lata, summa diminuta, oblonga, integra. Flores erecti, capsulae cernuae. Calyxis laciniæ longiusculæ acuminatae, acutæ, patule hirsutæ, plerumque violaceo-suffusæ, basin extus revolutæ, sinubus in appendices auriculatas, rotundatas, breves productis. Corollæ caeruleo-violaceæ, obconico-campanulatae, extus parce puberulæ, calyce ca. triplo longiores, usque 1.5 cm longæ. Semina nondum perfecte matura flava, valde complanata, brevissime albido-marginata, nitida.*

Ex Campanulae Aucheri DC. affinitate esse videtur, sed ab omnibus huius formis teste cl. Bornmüller differt.

Crescit in Tauro Armeno: Warak-Dar prope Wan, in fissuris rupium graniticarum alt. ca. 2650 m [*forma minus hirsuta, foliis minoribus (8—10 mm longis et 4—5 mm latis), caulinis semper unifloris*], legi 23. VIII. 1910 (No. 2143), et in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiali: Ěelo-Dar dit. Ěulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, in fissuris rupium

calcar. nigri alt. 2900—3000 m [*forma magis hirsuta, caulis interdum 2—3-floris, foliis maioribus, usque 3 cm longis et 8 mm latis*], legi 3. IX. 1910 (No. 2137 et 2142).

C. Radula Fisch. var. minor Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari (Taurus Armenus): ad pagum Šattak, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1500 m. 31. VIII. 1910 (No. 2141). Armenia Turcica: in castello urbis Wan, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1900 m (locus class.). 19. VIII. 1910 (No. 2140).

C. telephiooides Boiss. et Hausskn. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in declivitat. aridis alt. ca. 2200 m. 25. VII. 1910 (No. 2113); distr. Hakkiari: mons Siares supra pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, in herbidis aridis alt. ca. 1800 m. 19. VII. 1910 (No. 2114).

C. cissophylla Boiss. et Hausskn. Kurdistaniae Turcicae distr. Serizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1000 m. 24. V. 1910 (No. 2115); ad Rewandûz alt. ca. 600 m. 24. V. 1910 (No. 2116).

C. Mardinensis Bornm. et Sint. [Bornmüller: Novitates florae Orientalis, ser. I. Mitt. d. Thüring. Botan. Ver., neue Folge XX. pag. 32 (1905)] Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel ad septentr. ab oppido Môşul, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 600—700 m. 27. VI. 1910 (No. 2117).

C. perpusilla A. DC. Kurdistania Persica: infra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, ad rupes umbrosas, humidas, alt. ca. 900 m. 4. V. 1910 (No. 752).

C. stricta L. var. genuina Boiss. Forma *caulis firmis, rectis, simplicibus, apicibus depastis tamen usque 40 cm altis, dense retrorsum hispidis, albidis, nitentibus. Folia subcordiacea, pallide viridia, oblonga, acutiuscula, in margine subincrassata prorsus denticulata, in utraque facie pilis albis, e tuberculo ortis, hispida, usque 9 cm longa et 1.5 cm lata. Flores in foliorum axillis solitarii, pedunculis brevibus, vix 5 mm longis, bracteis pluribus, imbricatis, obtectis, suffulti. Calycis laciniae linearis-oblongae, obtusiusculae, pallide virides, hispidulae, 6—8 mm longae, calyce longiores. Appendices late ovato-triangulares, hispidae, calyci aequilongae et eum tegentes. Corolla magna, infundibuliformis, atro-violacea, usque 3 cm longa, glabra.*

Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in herbidis siccis ad monasterium Werin-Warak, alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 2148).

C. stricta L. var. jasione folia Boiss. Forma *floribus in spicam dispositis, corollis glabris.* — Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in rupestribus alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 2135). Forma *caulis plerumque unifloris, corollis glabris:* Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentriones ab oppido

Ğeziret-ibn-Ômar, ad rupes calcar. alt. 2000—2300 m frequens. 25. VII. 1910
(No. 2112 et 2136).

C. involucrata Auch. *Kurdistaniae Turcicae distr.* Šerizor:
Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in herbidis subalpinis
alt. ca. 1500 m. 22. V. 1910 (No. 2118).

C. glomerata L. *Kurdistaniae Turcicae distr.* Hakkiari: traiectus
de Chômar inter pagos Hoz et Šattak, in pascuis alpinis alt. ca. 2300 m.
30. VII. 1910 (No. 2138).



Fig. 1.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Campanula eo-cervicaria* Nk. (ca. $\frac{3}{4}$.) 2, 3, 4 *Campanula Bornmülleri* Nk.
(Habitus ca. $\frac{2}{3}$, calyx et capsula ca. $\frac{3}{4}$.)

Campanula eo-cervicaria Nábělek sp. nova. [Pag. 5, fig. 1,
tab. I, fig. 1.] *Tota pilis setosis, albis, patentibus, 1—1.5 mm longis
hispida. Caules firmi, recti, ca. 50 cm alti, cylindrici, obscure longitudinaliter
striati, rubelli, foliosi. Folia radicalia et basalia ignota,
caulina sessilia, basi cordata caules amplectentia, inferiora ovato-oblonga,
longe acuminata obtusiuscula, ca. 12 cm longa et 3.5—4 cm lata, super-
iora abbreviata, brevius acuminata, 5—6 cm longa et 2—3 cm lata, in
utraque facie dense pilis rectis, e tuberculo minimo ortis, setaceis, obsita,*

nervis subtus prominulis, albidis, supra vix distinctis, percursa, in margine irregulariter crenato-dentata. Florum sessilium fasciculi foliis summis late cordatis, subabrupte acuminatis, suffulti et bracteis pallide viridibus, late oratis, breviter acuminatis, acutiusculis, in margine setoso-ciliatis, basi glabris, apice hispidis, ca. 1 cm longis et 6–8 mm latis, involucrati. Capitulum terminale subglobosum, ca. 3–4 cm diametro tenens, foliis plerumque tribus, abbreviatis, in bracteas sensim transeuntibus, suffultum. Calycis laciniae 7–8 mm longae, longe acuminatae, acutae, in margine subrevoluta setis albis, ca. 1 mm longis, dense ciliatae, ad nervum subtus prominentem setulosae, capsula glabra, prominente 5-costata, triplo longiores. Corolla pallide caerulea, ca. 2 cm longa, glabra, infundibuliformis, in lobos oratos, acutos, plus quam ad $\frac{1}{3}$ fissa. Stylus corolla inclusus.

Species radice et foliis radicalibus deficientibus imperfecte nota, in affinitatem proximam Campanulae cervicariae L. pertinet, a qua imprimis caulibus cylindricis nec angulatis, foliis caulinis multo latioribus, ovato-oblongis nec linearis-lanceolatis, stylis brevibus, corolla inclusis nec eas superantibus etc. differt. Hanc speciem ulterius observandam Campanulae cervicariae vicariantem orientalem esse puto. Plantae Bosniaceae [Sarajevo, vallis Miljačka, leg. H. Laus in herbario universitatis Masarykianae Brunnensi] foliis latioribus praeditae transitum fortasse praebent.

Habitat in Kurdistaniae Turcicae districtu Hakkiari, ad pagum Hašītha dit. Čulamerik, in lapidosis inter agros alt. ca. 1500 m. Legi 17. VI. 1910 (No. 2142).

C. strigosa Russ. Gallilaea: ad Kades infra oppidum Şafed, inter segetes. 24. IV. 1909 (No. 2123).

C. Reuteriana Boiss. et Bal. Persia austro-occidentalis (Susiana): in lapidosis in Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran). 25. III. 1910 (No. 2126). Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn (prope Hanikîn), in rupestribus alt. ca. 900 m. 6. V. 1910 (No. 2125). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in rupestribus alt. 600–700 m. 9. VI. 1910 (No. 2124). Kurdistaniae Turc. distr. Hakkiari: mons Maidanoke supra pagum Hašītha dit. Čulamerik, in herbidis alt. ca. 1700 m. 19. VI. 1910. (No. 2127); mons Siares supra Hašītha, alt. ca. 1700 m. 20. VI. 1910 (No. 2129). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia legit Fr. Anastase Cadell (No. 2122).

C. sulphurea Boiss. Phoenicia litoralis: ad pagum Ekzîb dit. Akka, in sabula ad litus. 30. IV. 1909 No. 2134).

C. Hierosolymita Boiss. Judaea: Wâdi el-Kelt, prope Jericho, ad terram nudam alt. ca. -250 m. 30. III. 1909 (No. 2120 et 2128); ad 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, alt. ca. 300 m. 18. V. 1909 (No. 2119).

C. propinquua Fisch. et Mey. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari:

ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašitha, inter segetes alt. ca. 1200 m. 16. VI. 1910 (No. 2121).

C. Erinus L. Palaestina (Samaria): in agris ad Sebastije. 7. V. 1909 (No. 2132). *Kurdistania Persica*: supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in herbidis alt. ca. 1100—1200 m. 5. V. 1910 (No. 2131).

C. peregrina L. Libanon: ad monasterium Mâr Šâja prope pagum Brumâna supra Beirut, in vineis alt. ca. 800 m. 8. XI. 1910 (No. 2109).

C. Rapunculus L. *Judaea*: Abu Roš dit. Hierosolymae, in vineis alt. ca. 550 m. 2. IV. 1909 (No. 2133).

C. retrorsa Labill. Palaestina borealis: Tell-el-Kadi prope pagum Bânias (Caesarea Philippi), in herbidis ad fontem Jordani. 25. IV. 1909 (No. 2145). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: ad pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in herbidis alt. ca. 600 m. 22. V. 1910 (No. 2146); ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil et Rewandûz, inter frutices *Quercus* sp. alt. ca. 900 m. 24. V. 1900 (No. 2130).

C. Singarensis Boiss. et Hausskn. *Kurdistania Persica*: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, ad rupes humidas, umbrosas alt. ca. 800—900 m, in societate *Campanulae perpusillae*. Specimina tenerrima, minima florentia ca. 4 cm longa, foliis inferioribus fere rotundatis, longe petiolatis, simplicia. 4. V. 1910 (No. 2144); alt. ca. 2100 m, in fissuris rupium minus umbrosis forma rubustior, ramosa, forsitan perennans. 5. V. 1910 (No. 2110). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Revandûz, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1000 m. Forma robusta, ramosissima, No. 2110 similis. 24. V. 1910 (No. 2111).

Asyneuma lanceolatum (Willd.) Hand.-Mzt. var. *rigidum* (Willd.) Hand.-Mzt. — *Podanthum lanceolatum* (Willd.) Boiss. var. *rigidum* (Willd.) Boiss. [cf. Handel-Mazzetti: *Pteridophyta u. Anthoph. aus Mesopotam. u. Kurdistan*, Ann. naturhist. Hofmus. XXVII (1913) pag. 431]. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in saxosis alt. ca. 1900 m (*forma brerissime et parce pubescenti-scabrida*). 28. VII. 1910 (No. 2099). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 m (*forma dense pubescenti-aspera, corollis glabris, florum fasciculis inferioribus in spicas breves laxas elongatis*) 1. VIII. 1910 (No. 2101). Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in humosis alt. ca. 2200 m (*forma fere glabra, foliis praesertim in pagina inferiore ad nerros solum parce puberulis*). 23. VIII. 1910 (No. 2100).

A. lobelioides (Willd.) Hand.-Mzt. [= *Podanthum lobelioides* (Willd.) Boiss., cf. Handel-Mazzetti: *Pteridoph. u. Antoph. aus Mesopot. u. Kurdist.*, l. c. pag. 431.] *Kurdistaniae Turciae* distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğeziret-ibn-Ômar, inter frutices *Astragalorum* alt. ca. 1900 m. 25. VII. 1910 (No. 2103).

A. lobelioides (Willd.) Hand.-Mzt. var. *nova filipes* m. [Tab. I, fig. II.] *Racemorum rami elongati, tenues, laxi, pedicelli tenuissimi, fere filiformes, usque 5 mm longi, bracteas anguste linearis-lanceolatas, acutissimas, subaequantes aut eis dimidio breviores.* Adsunt formae duo: forma glaberrima foliis integris praedita et forma seabraida foliis basalibus margine repando-dentatis aut subintegris donata. Kurdistaniae Turcicae districtus Hakkiari: in valle rivi Howaraš inter pagos Baškala et Kočānes, inter frutices Astragalorum alt. ca. 2000 m (forma puberula). 30. VII. 1910 (No. 2104). Kurdistaniae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğeziret-ibn-Ômar, inter frutices Astragalorum alt. ca. 1900 m (forma glabra). 25. VII. 1910 (No. 2103 a).

A. lobelioides (Willd.) Hand.-Mzt. var. *nova capitatum* m. [Tab. VII, fig. 6.] *Racemi valde contracti.* Etiam huius varietatis forma scabrida et forma glabra adest. Kurdistaniae Turcicae dist. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğeziret-ibn-Ômar, inter cespites Astragalorum alt. ca. 2500 m. 25. VII. 1910 (No. 753 forma glabra, No. 2106 forma puberula); Kurdistaniae distr. Hakkiari: traiectus de Chômar inter pagos Hoz et Šattak, inter cespites Astragalorum alt. ca. 2200 m. Forma puberula. 31. VII. 1910 (No. 2105).

Asyneuma lobelioides indumento plus aut minus denso aut deficiente, foliis repando-dentatis aut integris, racemis laxis aut congestis, pedicellorum longitudine, caulibus clatis aut brevibus valde variabile esse videtur.

A. Persicum (A. DC.) Nábělek comb. nova var. *asperum* (Boiss.) Bornm. [= *Podanthum Persicum* (A. DC.) Boiss. var. *asperum* (Boiss.) Bornm. = *Podanthum asperum* Boiss. pro sp.; cf. Bornmüller: Plantae Straussianae, Beih. botan. Centralbl. XX.₂ (1906), pag. 178]. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in herbidis aridis alt. ca. 1500 m. 28. VII. 1910 (No. 2102).

Specularia pentagonia (L.) A. DC. *Judaea*: Wâdi ed-Ğôz et Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, inter segetes alt. 600—700 m. 24. et 25. III. 1909 (No. 2096 et 2097). *Armenia Turcica*: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 2095). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in herbidis alt. ca. 1100 m. 22. V. 1910 (No. 2098).

S. falcata (Ten.) A. DC. *Palaestina septentrionalis*: supra pagum Bâniás (Caesarea Philippi), in herbidis alt. ca. 650 m. 26. IV. 1909 (No. 2108). *Kurdistania Persica*: supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in herbidis alt. ca. 1100 m. 5. V. 1910 (No. 2107).

Tracheliopsis tubulosa (Boiss.) Buser var. *berytensis* Buser [= *Trachelium tubulosum* Boiss. Cf. Buser: Campanulacées, Bull. Herb. Boiss. II. (1894) pag. 525.] *Syria litoralis*: Nahr el-Kelb prope Beirut, ad rupes. 17. XI. 1910 (No. 2147).

Ericaceae.

Arbutus Unedo L. Libanon: ad monasterium Mâr Šâja prope pagum Brumâna dit. Beirut, alt. ca. 700 m. 28. X. 1909 (No. 197).

A. Andachne L. Judaea: ad pagum El-Kubebe (Emaus) dit. Hierosolymorum, in rupestribus alt. ca. 700 m. 26. VII. 1909 (No. 198).

A. Andachne L. var. serratula Post (Flora of Syria ... p. 509.)

Folia ovata, ovato-elliptica, et elliptica, obtusissima et acuta, basi integra, ceterum plus minus acute prorsus serrata, maxima usque 12 cm longa et 6 cm lata, petiolis ca. 2 cm longis suffulta. Rami annotini parcisime pilosuli. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: in valle prope pagum Bekât ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, arbuscula 3—4 m alta silvulam formant. 21. VII. 1910 (No. 42). Ad pagum Berka in eadem ditione (No. 40).

Erica verticillata Forsk. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirut alt. ca. 600—700 m frequentissima. X. 1909 (No. 195).

Rhododendron Ponticum L. var. brachycarpum Boiss. Libanon: ad monasterium Mâr Šâja prope pagum Brumâna dit. Beirut, alt. ca. 700 m. 18. X. 1909 (No. 196).

Primulaceae.

Samolus Valerandi L. Sinus Persicus: in palmeto ad oppidum Mênama in insula Bahrein. 8. II. 1910 (No. 2729). Persia austro-occidentalis: in paludibus ad ruinas Susorum. 15. III. 1910 (No. 2730).

Anagallis femina Mill. (A. coerulea Schreb.) Persia austro-occidentalis: ad ruinas Susorum, in apricis. 16. III. 1910 (No. 2734).

Lysimachia dubia Ait. Persia austro-occidentalis: in palude ad ruinas Susorum, 15. III. 1910 (No. 2733). Kurdistania Turcica: ad pagum Malai prope Tell Kef (Tell-is-Kof) dit. Môşul, in oryzetis alt. ca. 400 m. 6. V. 1910 (No. 2732).

L. vulgaris L. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Hadide ad orientem ab oppido S'ert, inter frutices Salizum ad rivum alt. ca. 600 m. 17. VII. 1910 (No. 2731).

Asterolinon Linum stellatum (L.) Lk. et Hfg. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Kaunak (Kônak) inter Šuštar et Dizfûl, in herbidis siccis. 12. III. 1910 (No. 79).

Cyclamen latifolium Sibth. et Sm. Judaea, ad rupes in Wâdi es-Sunnâr et Wadi ed-Ğôz prope Hierosolyma frequens alt. 500—700 m. 24. et 25. III. 1909 (No. 2735 et 2736). Libanon: ad pagum Brumâna dit. Beirut. 10. IX. 1909 (No. 2737).

Dionysia odora Fenzl. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Қasr-i-Širîn, ad rupes calcar. perpendiculares alt. ca. 1200 m. 5. V. 1910 (No. 2728).

D. bryooides Boiss. *Persia australis*: Kuh Chormûg dit. Bušir (Abu Šehr), ad rupes calcareas alt. ca. 2000 m. 19. II. 1910 (No. 2727).

Primula auriculata Lam. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in pascuis alpinis humidis alt. ca. 2600 m. 28. VII. 1910 (No. 2724).

P. auriculata Lam. var. *Straussii* Hsskn. (In herbario universitatis Vindobonensis.) *Taurus Armenus*: *traiectus Čâk* inter pagos Chôšab et Baškala dit. Wan, in pascuis humidis alt. ca. 2300 m. 29. VIII. 1910 (No. 2725).

Styracaceae.

Styrax officinale L. *Judaea*: ad pagum Bêt Šemâl prope Hierosolyma, alt. ca. 600 m. 6. IV. 1909 (No. 190). *Palaestina orientalis* (Ammon): Wâdi es-Sîr prope Arak el-Emîr, alt. ca. 650 m. 15. IV. 1909 (No. 2726). *Armenia Turcica*: ad pagos Akseraj et Nağarli dit. Mar'aš, alt. ca. 600—700 m silvulas formans. 13. X. 1910 (No. 191 et 192).

Oleaceae.

Fraxinus rotundifolia Mill. [= *Fraxinus parvifolia* Lam., *Fraxinus oxyacarpa* Willd. var. *parvifolia* Boiss.] *Kurdistaniae Turcicae* distr. Ramorân: ad pagum Hadide ad orientem ab oppido S'ert, ad rupes calcareas alt. ca. 650 m (frutices steriles). 19. VII. 1910 (No. 114); *Kurdistaniae* distr. Hakkiari: in valle fluv. Zab prope pagum Kočânes dit. Ĝulamerik, arbores 3—4 m altæ fructiferae. 3. IX. 1910 (No. 115).

Jasminum fruticans L. *Palaestina borealis*: ad pagum Bâniyas (Caesarea Philippi), ad rupes in fave humida alt. ca. 700 m. 26. IV. 1909 (No. 113). *Armenia Turcica*: ad pagum Kermechdi dit. Malatia, alt. ca. 1100 m. 9. X. 1910 (No. 112).

Salvadoraceae.

Salvadora Persica Garcin. 'Ain Šidi (Engaddi) ad litus occidentem Maris Mortui, ad fontem alt. ca. -200 m. 26. V. 1909 (No. 209).

Apocynaceae.

Nerium Oleander L. *Palaestina*: in valle fluv. Jordanis. Ad Jericho alt. ca. -250 m, 19. III. 1909 (No. 131), el-Rôr ad Jericho alt. ca. -350 m, 15. IV. 1909 (No. 132). *Palaestina orientalis* (Ammon): Wâdi Nîmrîn inter Jericho et Arak el-Emîr, alt. ca. +350 m, 15. IV. 1909 (No. 130); ad fluv. Jabok inter 'Ammân (Rabbath Ammon) et Geraš (Gerasa). 17. IV. 1909 (No. 134). Ad ripas lacus Tiberiadis frequens. Ad Bâniyas (Caesarea Philippi). In vallis Moabiticis et Arabiae Petraeae

(Wâdi) frequens: Wâdi Heidân, 25. VI. 1909 (No. 129), Wâdi ez-Zerka, 27. VI. 1909 (No. 135), Wâdi Môgib (Arnon), Wâdi el-Hsâ, Wâdi Mûsa (Petra). In Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari, in vallis profundis frutices humiles vix 2 m altas format. Ad fluvium Rusor inter Ĝezîret-ibn-Ômar et pagum Dehok, alt. ca. 600 m. 23. VIII. 1910 (No. 133).

Apocynum Venetum L. Kurdistania Turcica: in valle fluv. Bochtan infra oppidum S'ert, ad terram nudam, alt. ca. 560 m. 12. VII. 1910 (No. 127); in valle eiusdem fluvii ad pagum Chômar dit. Šattak, alt. ca. 1000 m. 30. VII. 1910 (No. 127a); in valle fluv. Zab prope pagum Kočânes dit. Ĝulamerik, alt. ca. 1200 m. 5. IX. 1910 (No. 128).

Asclepiadaceae.

Periploca Graeca L. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, alt. ca. 1000 m. 24. V. 1910 (No. 141). Kurdistaniae distr. Berwari: ad pagum Aradê in valle Sapna dit. Amadia, alt. ca. 900 m. 14. VI. 1910 (No. 142). Districtus Ramorân: inter pagos Godianos et Hadide ad orientem ab oppido S'ert, alt. ca. 600 m. 17. VII. 1910 (No. 143); ad pagum Tell Mišâr eiusdem ditionis, alt. ca. 750 m. 19. VII. 1910 (No. 144).

Cynanchum Tmoleum (Boiss.) K. Schum. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Bêdu inter pagos Aradê et Hašîtha, inter rupes calcar. alt. ca. 1560 m. 17. VI. 1910 (No. 124).

C. acutum L. Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad litus orientale Maris Mortui, alt. ca. -250 m. 27. VI. 1909 (No. 137). Armenia Turcica: in valle fluv. Erkenek inter Malatia et Mar'aš, alt. ca. 900 m. 11. IX. 1910 (No. 140).

Calotropis procera (Willd.) R. Br. Judaea: El-Rôr ad Jericho, alt. ca. -350 m. 18. VII. 1909 (No. 146). Rôr el-Mezra'a in peninsula El-Lisân Maris Mortui, alt. -390 m. 31. VI. 1909 (No. 145). 'Ain Ĝidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui. In Persia austro-occidentali (Susiana): in planicie inter Šuštar, Dizfûl, ruinas Susorum, et inde usque ad Deilerûn (Deh-i-Loran) ad radices montium Pušt-i-Kuh (Siah-Kuh).

Pentatropis spiralis (Forsk.) Decsn. Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad litus orientale Maris Mortui, alt. ca. -250 m. 28. VI. 1909 (No. 136).

Daemia cordata R. Br. Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad litus orientale Maris Mortui, alt. ca. -250 m. 28. VI. 1909 (No. 149). Persia australis: ad pagum Chawize ad radices montium Kuh Chormûğ dit. Bušir (Abu Šehr), inter rupes calcareas. 17. II. 1910 (No. 147).

Gomphocarpus Sinaicus Boiss. Arabia Petraea: Petra (Wâdi Mûsa), ad rupes arenaceas ad Ed-Dêr alt. ca. 850 m et in monte Hor (Ĝebel Hârûn) alt. ca. 1000 m. 19. VI. 1909 (No. 123 et 123a).

Marsdenia (Cionura) erecta (L.) R. Br. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, inter rupes calcar. alt. ca. 1000 m. 24. V. 1910 (No. 138). Ğeziret-ibn-Ômar, ad rupes in ripa sinistra Tigridis. 2. VII. 1910 (No. 139 a). In valle fluv. Bochtan infra oppidum S'ert. 12. VII. 1910 (No. 139).

Leptadenia pyrotechnica Forsk. Persia australis: Kuh Chormûğ dit. Bušir (Abu Šehr), ad rupes calcar. 19. II. 1910 (No. 126). Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh), ad rupes calcar. 25. III. 1910 (No. 125).

Gentianae.

Limnanthemum Indicum (L.) Griseb. Mesopotamia inferior: in paludibus ad Gurmet 'Ali dit. Bašra (Bassora). 12. I. 1910 (No. 2739). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 17. III. 1910 (No. 2783).

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Tell Kef (Tell-is-Kof) prope Malai dit. Môşul, ad rivulum alt. ca. 350 m. 6. VI. 1910 (No. 2740). Kurdistaniae distr. Šerizor: ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in declivit. siccis alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 2741).

B. serotina (Koch) Beck. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirut, alt. ca. 700 m. 10. X. 1909 (No. 2742).

Centaurea pulchellum (Sw.) Druce [= *Erythraea ramo-sissima* Pers.] Palaestina: ad 'Ain Duk prope Jericho, ad rivum alt. ca. -200 m. 31. VIII. 1909 (No. 2747). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: colles ad pagum Dêr Harîr dit. Erbil (Arbela), alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 2748).

C. turicum (Velen.) Nábělek comb. nova (*Erythraea turcica* Velen. cf. Velenovský, Flora Bulgarica p. 384). Kurdistania turcica (Assyria): inter pagos Tell Kef (Tell-is-Kof) et Malai dit. Môşul, in glarea rivi alt. ca. 400 m. 6. VI. 1910 (No. 2749). Districtus Berwari: ad pagum Mizurka dit. Amadia, alt. ca. 750 m. 22. VI. 1910 (No. 2750). Ad pagum Šéch Mâma in valle Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia, ad rivum alt. ca. 550 m. 23. VI. 1910 (No. 2752). Armenia Turcica: in glarea fluv. Gök-su ad pagum Surgi inter oppida Malatia et Mar'aš, alt. ca. 1000 m. 10. X. 1910 (No. 2751).

C. spicatum (L.) Fritsch [= *Erythraea spicata* L.] Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad litus orientale Maris Mortui. Ad rivum alt. ca. -200 m. 28. VI. 1909 (No. 2753).

Gentiana ciliata L. Taurus Armenus: infra pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in herbidis alt. ca. 1800 m. I. VIII. 1910 (No. 2761).

G. gelida M. B. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari (Taurus Armenus): mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in pascuis

humidis alt. 1900—2500 m. 30. VIII. 1910. (No. 2762; No. 2762a forma elata, caulis erectis, usque 35 cm altis.)

G. cruciata L. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in herbidis alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 2760).

G. Olivieri Griseb. In steppis et desertis a Persia australi usque in Kurdistaniam borealem frequens, in montibus usque ad ca. 1500 m ascendens. Persia australis: in deserto ad pagum Ahrâmi dit. Bušir (Abu Šehr), 16. II. 1910 (No. 2755); supra pagum Hawîze in radicibus montium Kuh Chormûg dit. Bušir. 17. II. 1910 (No. 2755a). Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis inter fluv. Čekâb et Tîb (inter ruinas Susorum et Deilerûn) frequentissima. 24. III. 1910 (No. 2754). Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in pascuis subalpinis alt. 1200—1500 m (forma robusta, caulis usque 25 cm altis, foliis radicalibus usque 1.5 cm latis et 14 cm longis). 5. V. 1910 (No. 2757). Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis ad pagum Dêr Harîr dit. Erbil (Arbela), alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 2756). In steppis ad pagum Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môşul, alt. 400—600 m. 10. VI. 1910 (No. 2758). Kurdistania Turcica, distr. Hakkiari: mons Siares supra pagum Hašîtha dit. Amadia, alt. ca. 1500 m. 19. VI. 1910 (No. 2759).

Sweertia (*Pleurogyne*) *Carinthiaca* Wulf. Taurus Armenus: Traiectus Čuk inter pagos Chôšab et Baškala, in pratis humidis ad Chân Čuchi alt. ca. 2300 m. 8. IX. 1910 (No. 2743). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Ĝelo-Dar dit. Ĝulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, ad nives tabescentes alt. ca. 2900 m. 3. IX. 1910 (No. 2743a).

S. Aucheri Boiss. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in herbidis subhumidis alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 2745). Mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in pratis subalpinis alt. ca. 1750 m. 31. VIII. 1910 (No. 2746).

Sesameae.

Sesamum Indicum S. Palaestina orientalis (Moab): ad pagum Mâdaba cultum. 10. VI. 1909 (No. 38). Armenia Tursica: ad pagum Chošmat inter Muš et Charput cultum. 1. X. 1910 (No. 39).

Convolvulaceae.

Convolvulus Dorycnium L. Gallilaea: ad 'Ain Tabra prope Tiberiadem, in saxosis alt. ca. — 200 m. 22. IV. 1909 (No. 704).

C. chondrilloides Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in querceto alt. ca. 950 m. 24. V. 1910 (No. 686).

C. Cantabrica L. f. patule hirsuta. Palaestina: Muchraka in monte Karmel, in saxosis alt. ca. 450 m. 2. V. 1909 (No. 685).

C. secundus Desr. Phoenicia: in sabula ad litus. 30. IV. 1909 (No. 687).

C. reticulatus Choisy. Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis inter pagos Tell Kef (Tell-is-Kof) et Maltau ad septentr. ab oppido Môşul, et inde in steppis ad radices montium infra pagum Mâr Jakub usque ad Zacho (Azach) alt. 350—400 m frequens. 6. et 27. VI. 1910 (No. 689 et 690).

C. Kotschyanus Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis et semidesertis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), inter Stipas. 22. et 24. III. 1910 (No. 676 et 677).

C. glomeratus Choisy. Judaea: 'Ain Čidi (Engaddi) in litore occidentali Maris Mortui, ad rivulum alt. ca. — 250 m. 26. V. 1909 (No. 2989).

C. pilosellaefolius Desr. Mesopotamia (Babylonia): in deserto inter Museijib et Kerbelâ. 15. IV. 1910 (No. 684); ad Bařdâd, 23. IV. 1910 (No. 683); ad Babylonem, leg. Dr. Reuter (No. 680). Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis ad colles inter Kerkuk et Erbil (Arbela), alt. 250—350 m. 17. et 18. V. 1910 (No. 681); in glareâ rivuli Nahr Astêre prope pagum Dêr Harîr dit. Erbil (Arbela), alt. ca. 600 m. 26. V. 1910 (No. 682); in steppis et in agris inter pagos Tell Kef (Tell-is-Kof) et Mâr Jakub dit. Môşul, alt. 300—400 m. 6. VI. 1910 (No. 678 et 679).

C. Galaticus Rostan. Taurus Armenus: in agris ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, alt. ca. 2000 m. 1. VIII. 1910 (No. 688).

C. hirsutus Stev. Palaestina: ad pagum Dêr Abân dit. Hierosolymorum, inter segetes alt. ca. 600 m. 6. VI. 1909 (No. 703, flores per pallide rosei). Kurdistanae Turcicae distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Čigîk inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 600 m. 19. V. 1910 (No. 701, flores albi). Kurdistanae Turcicae distr. Bervari: ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašitha, in agris inter segetes alt. ca. 1200 m. 16. VI. 1910 (No. 702, flores pallide rosei).

C. hirsutus Stev. var. *tomentosus* Boiss. Kurdistanae Turcicae distr. Hakkiari: mons Bestabije ad pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in agris alt. ca. 1600 m. 30. VII. 1910 (No. 700, flores pallide flavidi).

C. althaeoides L. Palaestina: ad pagum Abu Roš et Latrân dit. Hierosolymorum, in agris alt. ca. 500 m. 2. IV. 1909 (No. 696 et 697).

C. stachydifolius Choisy. Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis inter Kerkuk et Erbil (Arbela), alt. ca. 250—350 m. 17. V. 1910 (No. 694); ad pagum Dêr Harîr inter Erbil et Rewandûz, alt. ca. 600 m. 20. V. 1910 (No. 695).

C. arvensis L. Mesopotamia: ad Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 699).

Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 m. 1. VIII. 1910 (No. 698).

C. Scammonia L. *Palaestina borealis*: ad pagum Bâniás (Caesarea Philippi), inter frutices ad fontem. 26. IV. 1909 (No. 693). *Kurdistaniae Turc.* distr. Šerizor: ad pagum Baba Ğiğik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, inter frutices ad rivum alt. ca. 700 m. 29. V. 1910 (No. 692). *Kurdistania Turc. (Assyria)*: ad pagum Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môşul, inter frutices in fauce alt. ca. 450 m. 9. VI. 1910 (No. 691).

C. Siculus L. *Moab*: Wâdi ez-Zerka prope pagum Mâdaba, ad terram nudam alt. ca. 450 m. 27. VI. 1909 (No. 675).

C. pentapetaloïdes L. *Judaea*: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 700 m. 26. III. 1909 (No. 674); Dêr Abân dit. Hierosolymorum, ad terram nudam alt. ca. 500 m. 6. IV. 1909 (No. 673).

Cressa Cretica L. *Mesopotamia*: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 672). *Kurdistania Tureica (Assyria)*: in steppa ad Kerkuk, alt. ca. 300 m. 16. V. 1910 (No. 672a).

Cuseuta Epithymum L. *Persia austro-occidentalis (Susiana)* Cherr-e-Nemek in monticulis Kuh Beijât (Ğebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara, ad Stipam tortilem et Erucariam Aleppicam. 27. III. 1910 (No. 663).

C. Palaestina Boiss. *Judaea*: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, ad Marrubium vulgare, alt. ca. 700 m. 26. III. 1909 (No. 664). El-Rôr prope Jericho, alt. ca. — 300 m, ad Erucariam Aleppicam. 15. IV. 1909 (No. 667). *Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari*: ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašitha, alt. ca. 900 m. ad Salviam acetabulosam Vahl. 21. VI. 1910 (No. 670).

C. Babylonica Auch. *Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari*: in valle Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia, alt. ca. 650 m, ad Hedysarum varium Willd. 23. VI. 1910 (No. 662).

C. Viticis Hand.-Mzt. (Handel-Mazzetti): Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotamien... III. p. 394). *Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân*: in valle fluv. Rusôr prope pagum Dehok ad septentriones ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, alt. ca. 900 m, ad frutices Viticis Pseudo-Negundonis (Hausskn.) Hand.-Mzt. 23. VII. 1910 (No. 666).

C. monogyna Vahl. *Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari*: in valle fluv. Zab prope pagum Kočânes dit. Ğulamerik, ad Rosam sp. et ad Prunum monticolam C. Koch, alt. ca. 2000 m. 6. IX. 1910 (No. 665).

Borragineae.

Cordia Myxa L. *Judaea*: 'Ain Ğidi (Engaddi) in litore occidentali Maris Mortui, alt. ca. — 250 m. 26. V. 1909 (No. 72). Rôr el-Mezra'a in peninsula El-Lisân Maris Mortui, alt. ca. - 350 m.

Heliotropium supinum L. Armenia Turcica: ad pagum Habusi inter oppida Muš et Charput, in marginibus agrorum alt. ca. 1200 m. 2. X. 1910 (No. 606). Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 607).

H. tenuiflorum Guss. (= *H. Europeum* L. β *tenuiflorum* Boiss.) Mesopotamia: in deserto ad Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 605). Môşul, ad limum in ripa Tigridis, 30. V. 1910 (No. 604). Kurdistania: ad pagum Mâr Jakub dit. Tell Kef ad septentr. ab oppido Môşul, in ruderatis alt. ca. 1000 m. 12. VII. 1910 (No. 603).

H. villosum Desf. [Fig. 2, pag. 16] Judaea: ad pagum Bittir dit. Hierosolymorum, ad vias alt. ca. 550 m. 3. VI. 1909 (No. 609). Peninsula Maris Mortui El-Lisân, Rôr el-Mezra'a, ad rivulum, alt. ca. -350 m. 14. VI. 1909 (No. 608). Syria: Râs Beirut prope Beirut, ad viam. 3. XI. 1910 (No. 610).




Fig. 2

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—3. *Heliotropium villosum* Desf. 4—6. *Heliotropium Bovei* Boiss. var. *Bornmülleri* Nk. (Flores ca. $2\frac{1}{2}$ mm.)

H. Bovei Boiss. var. *nova Bornmülleri* Nk. [Fig. 2, pag. 16.] *Corollae magnae, 9—10 mm longae, tubus ca. 4·5 mm longus, cylindricus, extus hirsutus, lobi ca. 2 mm longi et 3 mm lati, acuti, convoluti, sinus omnino nudi. Indumentum totius plantae densissimum, adpressum, subsericeum, argenteum.* Kurdistania Turcica: inter pagum Chandûk ad Tigrudem infra Hassan Kef et fluv. Bochtan, ad solum argilosum aridissimum. Legi 12. VII. 1910 (No. 614).

H. circinatum Griseb. var. *macrantha* Stapf. [Fig. 3, pag. 17] Armenia Turcica: in glarea rivi Čame Golan inter oppida Muš et Charput, alt. ca. 1100 m 1. X. 1910 (No. 615).

Heliotropium ferrugineo-griseum Nábělek sp. nova. [Tab. I, fig. 3, pag. 17, fig. 3.] Sect. Bucanion Szczegl. *Annuum, in partibus iuvenilibus ferrugineum, ceterum griseum. Radix perpendicularis, parum ramosa, flavo-brunnea. Caulis rectus, setulis albis e tuberculo minimo orientibus, infra subpatentibus, nonnullis reflexis, superne sursum adpressis, densis, canescens, in apice setulis rufescentibus ferrugineus, et praeterea minute glandulosus, plantarum solitariarum, robustiorum, a basi*

divaricatum ramosus, plantarum densius satarum subsimplex aut supra solum ramosus. Folia longisculae petiolata, petiolis inferioribus laminea dimidium aequantibus, 12—15 mm longis, superioribus brevioribus, pilis albis, longis, subpatentibus dense obsitis. Lamina ovata, late acutiuscula, superne lineato-depressa, adpresso et molliter hirsuta et praeterea minute glandulosa, griseo viridis, subtus celeratim nerrosa, dense et adpresso hirsuta, pilis ad nervos longioribus, subpatentibus, argenteis. Folia iuvenilia ferrugineo-hirsuta. Spicae plerumque solitariae, e foliorum superiorum axillis orientes, aut coniugatae, longe pedunculatae, uniserialis, primum densiusculae floribus insimis remotis, demum laxiusculae, elongatae. Calycis ca. 4 mm longi subpatentem albo-setulosi, usque ad basin fere fissi, laciniac linear-lanceolatae, acutiusculae, corollae tubo




Fig. 3.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—3. *Heliotropium circinnatum* Griseb. 4—6. *Heliotropium ferrugineo-griseum* Nk.
(Flores ca. $2\frac{1}{2}$ mm.)

acquiloniae. Corollae albæ, 8—12 mm longæ, tubus extus hirsutus ca. 4 mm longus, limbus infra densius, sursum parce hirsutus, superne glaber, ca. 7 mm longus, longitudinaliter plicatus, lobis ca. 2·5 mm longis, convolutis, acutis, apicibus uncinnatim inflexis, sinibus denticulis triangularibus, inflexis, instructis. Antheræ paulum infra medium tubum affixaæ, ca. 2 mm longæ, in apice obtusiuscula, recta, flavæ. Stylus brevissimus, stigma e basi dilatata ovario aequilata abrupte attenuatum, anguste cylindricum, apice hispidum. Nuculae ignotæ.

Habitu et indumenti colore *Heliotropium Bowei* Boiss. refert et huius affinitatis verisimiliter esse videtur, sed ab eo imprimis corollae lobis acutis nec obtusis et florum magnitudine differt.

Habitat in Mesopotamia superiore (Gebel et Tur, Tur Abdin) ad monasterium Dêr el-Ahmâr dit. Midiat, in margine agrorum alt. ca. 1000 m, legi 7. VII. 1910 (No. 613), et in Kurdistania Turcica ad pagum Mâr

Jakub dit. S'ert, in agris et ad vias alt. ca. 920 m, legi 18. VII. 1910 (No. 66).

H. rotundifolium Sieb. Gallilaea: 'Ain Tîne et 'Ain Tabrä prope Tiberiadem, alt. ca. -200 m 22. IV. 1909 (No. 619 et 620). Judaea; 'Ain Duk prope Jericho, alt. ca. -250 m. 31. III. 1909 (No. 618). Moab: Wâdi ez-Zerka dit. Mâdaba, alt. ca. 200 m. 28. V. 1909 (No. 617).

H. Persicum Lam. Judaea: 'Ain Ĝidi (Engaddi) ad litus occid. Maris Mortui, alt. ca. -300 m. 26. V. 1909 (No. 611). Persia austro-occidental (Susiana): Cherr-e-Nemek in montibus Kuh Beijât (Gebel Hamrân) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem. 27. III. 1910 (No. 612).

Cerinthe minor L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Siares supra pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik, in humosis alt. ca. 1600 m. 19. VI. 1910 (No. 624); distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ĝeziret-ibn-Ômar, in lapidosis alt. ca. 2300 m. 25. VII. 1910 (No. 623).

C. major Lam. Palaestina orientalis (Gilead): Arak el-Emîr, inter rupes alt. ca. 450 m. 15. IV. 1909 (No. 625).

Anchusa undulata L. Judaea: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, alt. ca. 700 m. 25. III. 1909 (No. 579). Gallilaea: ad oppidum Şafed, in lapidosis alt. ca. 800 m. 24. IV. 1909 (No. 578).

A. Azurea Mill. (= *A. Italica* Retz.) Armenia Turcica: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 569).

A. macrocarpa Boiss. et Hoh. Taurus Armenus: inter pagos Šattak et Gurundašt dit. Wan, in agris alt. ca. 1800 m. 31. VIII. 1910 (No. 574).

A. strigosa Labill. Judaea: Wâdi ed-Ĝôz prope Hierosolyma, in fissuris rupium alt. ca. 700 m. 25. III. 1909 (No. 576); ad pagum Abu Rôš prope Hierosolyma, ad viam alt. ca. 450 m. 2. IV. 1900 (No. 577). Persia austro-occidental: ad ruinas Susorum, in agris. 15. III. 1910 (No. 567.)

A. neglecta Alph. DC. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Maidanoke supra pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik, in humosis ad latus septentrionale alt. ca. 1800 m. 21. VI. 1910 (No. 575).

A. Aucheri Alph. DC. Kurdistaniae Persica: montes supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in herbidis alt. ca. 1800 m. 5. V. 1910 (No. 573). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in humosis alt. ca. 1000 m. 24. V. 1910 (No. 653).

A. arvensis (L.) M. B. var. *Orientalis* (L.) O. Kuntze. Armenia Turcica: ad pagum Chôšab (Mahmudije) dit. Wan, in agris alt. ca. 1800 m. 7. IX. 1910. (No. 568).

Nonnea obtusifolia (Willd.) R. et Sch. Judaea: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, in marginibus agrorum alt. ca. 700 m. 25. III. 1909 (No. 561.)

N. melanocarpa Boiss. *Persica austro-occidentalis* (*Susiana*): ad pagum Šellelat dit. Šuštar, in agris. 9. III. 1910 (No. 565); in steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (*Deh-i-Loran*), 24. III. 1910 (No. 560).

N. Armena Boiss. et Huet. [Fig. 4, pag. 19] *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkiari: mons Dwile supra pagum Hašitha dit. Čulamerik, in humosis alt. ca. 2000 m. 18. VI. 1910 (No. 562), mons Siares eiusdem dit., in pascuis alpinis alt. ca. 1800 m. 19. VI. 1910 (No. 562); mons Kêla Mame supra pagum Hoz, inter Hašitha et Šattak, in pascuis alpinis alt. ca. 2700 m. 28. VII. 1910 (No. 559 et 564).

N. anchusoides Boiss. et Buhse. *Armenia Turcica*: Malatia, in agris, legit Fr. Anastase Cadell (No. 570).

Symphytum Palaestinum Boiss. *Judaea*: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, inter rupes umbrosas alt. 600—750 m. 25. III. 1909 (No. 583).




Fig. 4.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Nonnea Armena Boiss. et Huet. (ca. 2·5/₁.)

S. Kurdicum Boiss. et Hausskn. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (*Arbela*), in humosis humidis ad fontem alt. ca. 1600 m. 22. V. 1910 (No. 582); in lapidosis alt. ca. 1900 m forma humilior firmior (No. 580); Handrian-Dar prope Rewandûz, inter frutices queruum alt. ca. 1200 m. 23. V. 1910 (No. 581).

Onosma Aleppicum Boiss. *Kurdistania turcica* (*Assyria*): Čebel Kumataš inter Kezrabad et Hanikîn, in steppa alt. ca. 250 m. 3. V. 1910 (No. 633). Ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel ad septentr. ab oppido Môşul, ad rupes calcar. alt. ca. 600 m. 27. VI. 1910 (No. 632).

O. rostellatum Lehm. *Kurdistania Persica*: montes supra pagum Režâb dit Kasr-i-Širîn, in fissuris rupium calcareum alt. ca. 1000 m. 5. V. 1910 (No. 621).

O. sericeum Willd. (= *O. flavum* [Lehm] Vatke). *Kurdistania Persica*: ad rupes calcar. supra pagum Sar-i-Pul dit. Kasr-i-Širîn, alt. ca. 550 m. 6. V. 1910 (No. 635); ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širin, ad rupes calcareas alt. ca. 800 m. 6. V. 1910 (No. 634); *Armenia Turcica*: ad oppidum Malatia alt. ca. 1000 m legit. Fr. Anastase Cadell (No. 636).

O. sericeum Willd. var. *nova argenteum* Nábělek. [Fig. 5, pag. 20.] *Totum pilis adpressissimis e tuberculo minimo ortis densissime sericeo-argenteum. Rhizoma suffruticosum, 5–8 mm crassum, atro-violaceum, in fissuras rupium descendens. Folia rosularum sterilium et caulinum floriferorum quam folia typi longiora, angustiora et acutiora, rosularum usque 13 cm longa et 12–14 mm lata, in petiolum longe attenuata, caulinis sursum sensim diminuta, petiolo breviore suffulta, summa solum sessilia. Caules floriferi recti, firmi, obtuse angulati, adpresso setulosi, inferne ca. 4 mm crassi. Flores et nuculae cum typicis congruentes.*

Differt a typo imprimis indumento densiore, sericeo-argenteo, setularum tuberculis minoribus, foliorum forma, caulis rectis, firmioribus.

Habitat in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari in monte Bestabije prope pagum Hoz inter pagos Hašītha et Šattak, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1600 m. Legi 30. VII. 1910 (No. 671).




Fig. 5.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Onosma sericeum Willd. var. *argenteum* Nk. (ca. 2[—]5/1.)

O. subsericeum Freyn. Kurdistania Persica: ad Kasr-i-Širin dit. Hanikin, in steppa alt. ca. 400 m. 7. V. 1910 (No. 637).

O. nemoricolum Hausskn. et Bornm. [Fedde, Repert. nov. spec. VIII (1910) 540.] Kurdistaniae Turc. distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 1000 m. 21. V. 1910 (No. 641); Handrian-Dar prope Rewandûz, alt. ca. 1000 m., 23. V. 1910 (No. 643a); forma *parviflora*, floribus minoribus: Handrian-Dar alt. ca. 1500 m., 23. V. 1910 (No. 643); Kurruk-Dar prope Rewandûz, alt. ca. 1600 m. 22. V. 1910 (No. 642).

O. Elwendicum Wettst. α *concolor* Hausskn. (Wettstein: Stapf, Polak-Exp. I. 28.) = *O. Bodeanum* Boiss. [Bornmüller in litteris] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Maidanoke supra pagum Hašītha dit. Čulamerik, alt. ca. 2100 m. 20. VI. 1910 (No. 644).

O. frutescens Lam. Palaestina septentrionalis: mons Hermon (Čebel eš-Šéch), supra pagum Bânias (Caesarea Philippi), ad rupes alt. ca. 800 m. 26. IV. 1909 (No. 645).

O. chlorotrichum Boiss. et Noë. Kurdistania Turcica (Assyria): in steppa ad colles aridissimos ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela)

et Rawandûz, alt. ca. 500 m., 20. V. 1910 (No. 639). *Kurdistaniae Turc.* distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašitha, in steppa alt. ca. 1000 m. 16. VI. 1910 (No. 640); ad pagum Gabenerik eiusdem dit., alt. ca. 900 m. 22. VI. 1910 (No. 638).

O. molle DC. *Armenia Turcica*: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 631).

O. albo-roseum Fisch. et Mey. *Kurdistania Persica*: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, ad rupes calcar. alt. 800—900 m. 6. V. 1910 (No. 627); ad pagum Sar-i-Pul dit. Kasr-i-Širîn, alt. ca. 550 m., 6. V. 1910 (No. 629). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkîari: mons Maidanoke supra pagum Hašitha dit. Ğulamerik, ad rupes calcar. alt. ca. 2100 m. 20. VI. 1910 (No. 630).

O. stellulatum W. K. var. *pallidum* Boiss. *Arabia Petraea*: Wadi Šôbak infra Eš-Šôbak inter El-Kerak et Wâdi Mûsa (Petra), ad rupes calcar. aridissimas alt. ca. 450 m. 17. VI. 1909 (No. 628).

O. giganteum Lam. *Palaestina*: planities Esdrelon inter Nazaret et Ĝenîn, 3. V. 1909 (No. 646).

O. (Podonosma) Syriacum Labill. *Judaea*: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, ad rupes alt. ca. 700 m. 24. III. 1909 (No. 626). *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), ad rupes calcar. in fauce humida, forma umbrosa foliis magnis, caulis laxis. 25. III. 1910 (No. 622).

Echium italicum L. *Kurdistania Persica*: ad pagum Sar-i-Pul dit. Kasr-i-Širîn, in lapidosis aridis alt. ca. 500 m frequens. *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): inter pagos Tell Kef et Maltai dit. Môşul, ad rivulum alt. ca. 400 m. 17. V. 1910 (No. 648 et 649).

E. glomeratum Poir. *Palaestina*: Planities Esdrelon, in graminosis humidis ad Tell el-Mutesselim (Megiddo). 3. V. 1909 (No. 650).

E. sericeum Vahl. var. *hispidum* Boiss. *Judaea*. Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in lapidosis alt. ca. 700 m. 24. III. 1909 (No. 652).

E. plantagineum L. *Galilaea*: 'Ain Tabra (et-Tabira) prope Tiberiadem, in lapidosis alt. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 651).

Echiochilon fruticosum Desf. *Arabia Petraea*: Ğebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), in fissuris rupium arenac. alt. ca. 1200 m. 19. VI. 1909 (No. 588).

Arnebia decumbens (Vent.) Coss. et Kral [Bull. soc. bot. Fr. IV. pag. 402 (1857)] = *Arnebia cornuta* (Ledeb.) F. et Mey forma *parviflora* Bornm. *Judaea*: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in margine agrorum alt. ca. 700 m. 24. III. 1909 (No. 542). *Mesopotamia*: ad Babylonem, in deserto limoso, leg. Dr. Reuter (No. 541). *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): ad ruinas Susorum, in deserto humoso in alveolis. 18. III. 1910 (No. 540). Forma *grandiflora* Bornm.: *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): ad Deilerûn (Deh-i-Loran), ad fontes naphtae, in steppa humosa. 26. III. 1910 (No. 554). Kuh Beijât (Ğebel Hamrîn)

inter Deilerûn et oppidum Amara ad Tigridem, ad terram nudam sabulosam in alveolis. 27. III. 1910 (No. 555).

A. decumbens (Vent.) Coss. et Kral. var. *macrocalyx* Coss. et Kral. Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân, 20. VI. 1909 (No. 543).

Lithospermum arvense L. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Handrian-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in graminosis alt. ca. 1700 m. 23. V. 1910 (No. 544).

L. tenuiflorum L. fil. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppa ad radices montium Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) prope Deilerûn (Deh-i-Loran). 26. III. 1910 (No. 546). Kurdistania Persica: ad Қasr-i-Širîn dit. Hanikîn, in steppa alt. ca. 450 m. 7. V. 1910 (No. 545).

Moltkia coerulea (Willd.) Lehm. Armenia Turcica: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 647).

Alkanna strigosa Boiss. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, inter rupes alt. ca. 750 m. 24. III. 1909 (No. 538).

A. Orientalis (L.) Boiss. forma angustifolia, foliis usque 10 cm longis et 12 mm latis. Arabia Petraea: Ğebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), ad rupes arenaceas in cacumine alt. ca. 1320 m. 19. VI. 1909 (No. 557).

A. Galilaea Boiss. Palaestina: Planities Esdrelon inter Nazareth et Ĝenîn, in margine agrorum. 7. V. 1909 (No. 556).

Myosotis caespitosa Schultz var. *nana* Stadlm. [J. Stadlmann: Fedde Repert. II. No. 24 (1906).] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, ad fontem alt. ca. 1700 m. 18. VI. 1910 (No. 548).

M. Olympica Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari; mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Amadia et Hašîtha, inter fruticulos Astragalorum et ad rupes calcar. alt. 2700—2750 m. 28. VII. 1910 (No. 549). Taurus Armenus: mons Harefta inter Baškala et Kočânes, ad nives tabescentes alt. ca. 2750 m. 31. VIII. 1910 (No. 550).

M. Olympica Boiss. β *laxa* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Hašîtha dit. Ğulamerik, prata humida alt. ca. 1400—1500 m. 17. VI. 1910 (No. 551); mons Dwile supra pagum Hašîtha, in humosis humidis alt. ca. 1700 m. 18. VI. 1910 (No. 553); mons Maidanoke supra pagum Hašîtha, in pratis subalpinis alt. ca. 1800 m. 20. VI. 1910 (No. 552).

M. propinqua F. et M. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: prata humida supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, alt. ca. 1650 m. 18. VI. 1910 (No. 547).

Rochelia stellulata Rohb. Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Қasr-i-Širîn, ad terram nudam alt. ca. 1600 m. 5. V. 1910 (No. 539).

Lappula Szowitsiana (Fisch. et Mey.) Druce = *Echinosperrum Szowitsianum* Fisch. et Mey. Persia austro-occidentalis: ad

pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâz et Šuštar, in limosis ad ripam fluv. Ab-i-Girgir, 8. III. 1910 (No. 592).

L. Vahliana (Forsk.) Nábělek comb. nova [= *Echinosperrum Vahlianum* Lehm. == *E. spinocarpus* (Forsk.) Boiss. == *Lappula spinocarpus* (Forsk.) Aschers.], *Arabia Petraea*: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân. 20. VI. 1909 (No. 591).

L. microcarpa (Led.) Guerke [= *Echinosperrum microcarpum* Led.]?, specim. nimis iuvenilia. *Kurdistan. Turec. distr.* Šerizor: Handrian-Dar prope pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in graminosis aridis alt. ca. 1700—1800 m. 23. V. 1910 (No. 589). *Kurdistania Persica*: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in graminosis alt. ca. 1700 m. 5. V. 1910 (No. 590).

Paracaryum rugulosum (DC.) Boiss. α *brevistylum* Bornm. (Bornmüller, *Plantae Straussianae*, Beih. Botan. Centralbl. XX (2. pag. 190). *Kurdistania Persica*: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in graminosis alt. ca. 900 m. 6. V. 1910 (No. 594).

P. strictum (C. Koch) Boiss. *Kurdistaniae Turcicae distr.* Šerizor: Handrian-Dar prope pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in lapidosis alt. ca. 1900 m. 23. V. 1910 (No. 572). *Armenia Turcica*: ad oppidum Malatia leg. F. Anastase Cadell (No. 571).

Paracaryum Luristanicum Nábělek sp. nova. [Tab. VI, fig. 4., pag. 24, fig. 6.] *Sectio Mattiastrum* Boiss. *Bienn. Totum pilis setiformibus, rigidis, patentibus aut ad canis basin deflexis, e tuberculo orientibus, albis, canescens. Radix perpendicularis, atroviolacea, apice usque 5 mm crassa. Folia rosularia primi anni florendi tempore iam siccata, folia annotina radicalia oblonga, acuminata, in petiolum laminae longitudinem superantem, usque 6—7 cm longum sensim attenuata, in pagina superiore pilis setiformibus, usque 2 mm longis, e tuberculo albo, maiusculo orientibus, minus dense, in pagina inferiore pilis minus rigidis, e tuberculo minuto orientibus, sed densioribus obtecta, nervo infra valde prominente percursa. Folia cum petiolis usque 13 cm longa, lamina 5—6 cm longa et 10—12 mm lata. Folia caulina sursum sensim diminuta, inferiora in petiolum brevem attenuata, radicalibus conformia, superiora sessilia, e basi latiore, caulem subamplectente, sensim acuminata, acuta. Caules 20—25 cm alti, recti, firmi, plerumque simplices aut superne pauciramosi, racemos plerumque 2, laxos, elongatos, secundos gerentes. Flores pedicellis erecto-patentibus, dense et patenter griseo-hirtis, calycis longitudinem ea. duplo superantibus, tum elongatis, suffulti. Calyx setulis e tuberculis orientibus dense adpresso hirtus, in lacinias ca. 5 mm longas, lineares, acutiusculas, fere ad basin fissus, fructifer deflexus, valde accretus, lacinias usque 8—10 mm longis. Corollae atro-violaceae tubus ca. 4 mm longus, limbo aequilongus, calyce brevior. Fornices e tubo parum excedentes incurvae, apice capitato-subinflatae, subbilobae. Nuculae nondum maturae ad discum minime tuberculatae, oratae, acutae, areola plana, parum un-*

dulata, in margine subrevoluta minutissime denticulata, ca. 2—2.5 mm lata, cinctae, cum areola ca. 10 mm longae et 9 mm latae. Stylus nuculis fere aequilongus.

Habitu *Paracaryum Aucheri* (Alph. D. C.) Boiss. refert, sed ab eo indumento multo rigidiore, fornicibus brevioribus, membrana integra etc. differt.

Habitat in Persia austro-occidentali (Susiana, Luristan) in montibus Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), in humosis lapidosis. Legi 25. III. 1910 (No. 593).




Fig. 6.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Paracaryum Luristanicum Nk. (Flos et corolla ca. 2.5/₁, nuculae ca. 1.5/₁.)

Solenanthus petiolaris DC. *Kurdistania Persica*: montes supra Kasr-i-Širîn dit. Hanikîn, in humosis alt. ca. 1200 m et 1700 m. 5. V. 1910 (No. 597). *Kurdist. Turcicæ distr. Šerizor*: Handrian-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), alt. ca. 1000 m. 23. V. 1910 (No. 596).

Mattia lanata (Lam.) Schult. [= *Cyphomattia lanata* (Lam.) Boiss. = *Rindera lanata* (Lam.) Gürke.] *Kurdistania Persica*: montes supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in humosis alt. ca. 1500 m. 5. V. 1910 (No. 595).

M. (Rindera) albida Wettst. [Die botan. Ergebnisse der Polakschen Expedition nach Persien; Denkschr. d. Akad. d. Wissenschaften, Wien, Bd. L (8885), pag. 32]. *Kurdistaniae Turcicæ distr. Hakkiari*: mons Maidanoke supra pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik, in alveolo nivali alt. ca. 1800 m. 20. VI. 1910 (No. 566).

Asperugo procumbens L. *Persia austro-occidentalis* (Susiana): ad ruinas Susorum in alveolis frequentissima 18. III. 1910 (No. 586). Mesopotamia: Babylon, in agris, 18. IV. 1910 (No. 584; 585 et 587 leg. Dr. Reuter). Arabice Lisieğ aut Idnêñ el-Harûf i. e. arietis aures vocatur.

Caccinia crassifolia (Vent.) O. Kuntze [A. H. Petrop. X. 212] = *C. glauca* Savi. *Persia austro-occidentalis* (Susiana): Kûh Beijât (Čebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem, ad solum arenaceum in alveolis. 28. III. 1910 (No. 598).

Trichodesma incanum (Bge.) DC. [Lipsky: A. H. Petrop. XXVI. p. 490] = **T. molle** DC. *Kurdistania Turcicae*: ad oppidum S'ert, in vineis alt. ca. 900 m frequens. 14. VII. 1910 (No. 599).

T. Boissieri Post. *Judea*: Wâdi el-Kelt prope Jericho, inter rupes aridas calcar. alt. ca. -300 m. 30. III. 1909 (No. 600 et 601). *Moab*: ad 'Arak el-Emîr, inter rupes alt. ca. 450 m (loc. class.). 15. IV. 1909 (No. 602).

Solanaceae.

Solanum nigrum L. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, in saliceto ad rivum alt. ca. 760 m. 19. VII. 1910 (No. 2047). *Armenia Turcica*: ad pagum Čabachčûr, in ruderatis alt. ca. 950 m. 29. IX. 1910 (No. 2048). *Mesopotamia*: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 310).

S. villosum Lam. *Judea*: 'Ain Čidi (Engadi), ad fontem alt. ca. -250 m. 26. V. 1909 (No. 309).

S. Dulcamara L. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, in saliceto alt. ca. 760 m. 19. VII. 1910 (No. 308).

S. incanum L. (= *Solanum sanctum* L., *S. coagulans* Forsk.) *Judea*: Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, ad rivum alt. ca. -120 m. 30. III. 1909 (No. 306); ad Jericho, ad fossas irrigationis alt. ca. -250 m. 18. III. 1909 (No. 307).

Physalis Alkekengi L. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, inter frutices alt. ca. 760 m. 19. VII. 1910 (No. 2045).

Withania somnifera L. *Galilaea*: ad 'Ain Tabra et 'Ain Tîne dit. Tiberiadis, ad fontes alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 330 et 331).

Lycium Europaeum L. *Judea*: Wâdi el-Kelt prope Jericho, alt. ca. -250 m. 30. III. 1909 (No. 324).

L. Barbarum L. var. *brevilobum* Post. *Palaestina orientalis* (Ammon): in ruinis oppidi 'Ammân (Rabbath Ammon), alt. ca. 830 m. 16. IV. 1909 (No. 320). *Arabia Petraea*: Wâdi Kerak infra oppidum El-Kerak, alt. ca. 450 m. 15. VI. 1909 (No. 326). *Mesopotamia*: ad pagum Meskene inter Aleppo (Haleb) et Rakka, alt. ca. 220 m. 3. XII. 1909 (No. 323); ad Kal'a Feluğâ ad Euphraten, dit. Bardâd, 22. XII. 1909 (No. 322 et 325); ad Babylon leg. Dr. Reuter (No. 327). *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): in ripa fluv. Âb-i-Girgir ad pagum Šellelat dit. Šuštar. 9. III. 1910 (No. 328). *Persia australis*: ad pagum Ahrâmi dit. Bušîr (Abu Šehr). 16. II. 1910 (No. 329).

L. Ruthenicum Murr. *Kurdistania Turcica*: ad oppidum S'ert, inter sepes, alt. ca. 850 m. 14. VII. 1910 (No. 321). *Armenia Turcica*: Wan, ad rupes castelli alt. ca. 1780 m. 19. VIII. 1910 (No. 2046).

Mandragora officinarum L. Frequens in Judaea dit. Hierosolymorum; frequentissima ad Tell el-Mutesselim (Megiddo) dit. Ĝenîn.

Datura Stramonium L. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido do S'ert, in ruderatis alt. ca. 760 m. 19. VII. 1910 (No. 312).

Hyoscyamus muticus L. Persia australis: Kuh Chormûg dit. Bušir (Abu Šehr), ad rupes supra pagum Hawîze. 19. II. 1910 (No. 317). Kurdistania Persica: ad pagum Sar-i-Pul dit. Kasr-i-Širîn, ad rupes alt. ca. 500 m. 4. V. 1910 (No. 2050).

H. reticulatus L. Palaestina orientalis (Ammon): inter 'Ammân (Rabbath Ammon) et fluv. Jabok, ad viam alt. ca. 950 m. 17. IV. 1909 (No. 316). Kurdistania Turcica: ad pagum Taz-Šâr inter Hanikin et Salahîje (Kifri), in ruderatis alt. ca. 250 m. 9. V. 1910 (Nr. 315). Ad oppidum S'ert, in ruderatis alt. ca. 850 m. 12. VII. 1910 (No. 2049). Kurdistaniae Turc. distr. Hakkiari. in monte Siares supra pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik, alt. ca. 1700 m. 19. VII. 1910 (No. 2044).

H. albus L. Judaea: El- Kubebe (Emaus) dit. Hierosolymorum, alt. ca. 800 m. 3. IV. 1909 (No. 314).

H. albus L. var. *desertorum* Ascherson. Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân. 20. VI. 1909 (No. 318).

H. aureus L. Judaea: Hierosolymis et dit. ad muros, rupes etc. frequentissimus. Wâdi es-Sunnâr dit. Hierosolymorum, alt. ca. 700 m. 25. III. 1909 (No. 313).

Nicotiana glauca Grah. Hierosolymis undique subs spontanea (No. 319).

Scrophulariaceae.

Verbascum alceoides Boiss. et Hausskn. *Filamenta basi glabra, a medio ad apicem violaceo-lanata; corolla intus aurea, extus canotomentella, odoratissima.* Kurdistaniae Turcicae distr. Ŝerizor: ad pagum Baba Ĝiğik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, ad rupes quarцитicas alt. ca. 700 m. 21. V. 1910 (No. 2032).

V. *Andrusi* Post [Plantae Postianae, Bull. Herb. Boiss. VII., p. 161 (1895)]¹ Boiss. *Flores odorati.* Mesopotamia superior (Ĝebel et-Tur, Tur Abdin): ad oppidum Midiat, ad colles aridos alt. ca. 550 m. 10. VII. 1910 (No. 2033.).

V. *Syriacum* Schrad. Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel ad septentr. ab oppido Môşul, ad rupes calcar. alt. ca. 600 m. 10. VI. 1910 (No. 1949).

V. *mucronatum* Lam. Mesopotamia: in silvula salicium et Populi Euphratici ad Môşul. 30. V. 1910 (No. 1955). Ĝebel et-Tur (Tur

¹ Determ. cl. J. Bornmüller.

Abdin): Hassan Kef (Hisn Keifa), ad rupes calcar. castelli. 10. VII. 1910 (No. 2035).

V. *Sinaiticum* Benth. *Arabia Petraea*: Wâdi Kerak infra oppidum El-Kerak. alt. ca. 700 m. 15. VI. 1909 (No. 1943). *Palaestina orientalis* (Gilead): ad pagum Ģeraš (Gerasa), in steppa alt. ca. 550 m. 18. IV. 1909 (No. 1942, determ. incerta).

Verbascum Anastasii Nábělek sp. nova. [Tab. II, fig. 1.] Sect. *Lychnitis* Bth. § *Glomerulosa* Boiss. *Biennie, radice unicipite, cortice brunnea obtecta. Caulis rectus, ca. 90 cm altus, basi ca. 8 mm crassus, subsimplex, ad inflorescentiae basin ramulis tenuibus paucis auctus, inferne ad ca. 25 cm dense foliatus, lana densa alba pilis ramosissimis candelabriglobis usque 3 mm longis composita, detersili, cito evanida obtectus, demum glaber, nitidus. Folia rosulata oblongo-lanceolata, in petiolum 2—2·5 cm longum sensim attenuata, acutiuscula, in margine undulato-crenulata, indumento copiosissimo. albo, floccoso, parum detersili, lanata, nerris supra canaliculatis, subtus prominulis percursa, cum petiolo ca. 11 cm longa et 3—3·5 cm lata. Folia caulina sensim diminuta, inferiora breviter petiolata, superiora sessilia, basi rotundata caules subamplectentia, ceterum foliis rosulatis similia, sed indumento minus denso plus detersili viridiora, summa valde diminuta, basi subcordata caules subamplectentia, breviter decurrentia, in apicem acutam longe acuminata. Florum glomeruli plerumque 5-flori, 1·5—2 cm inter se distantes. Bracteae parvae, 6—8 mm longae, e basi ovata longe acuminatae, acutissimae, basi excepta glabrae, omnes fere conformes. Pedicelli inaequales, alteri brevissimi, alteri calycis longitudinem subaequantes, 3—5 mm longi, densissime albo-lanati, erecti, crassiuseuli. Calyx 7—8 mm longus, fere ad basin in dentes lanceolatos, acuminatos, acutos, ad basin argenteo-gossypinos, ceterum cito glabrescentes, virides, dorso leviter carinatos, fissus. Corolla magna, usque 4·5 cm diametro tenens, e sicco aurea, in alabastro extus argenteo-gossypina, sub anthesi ad basin solam extus argenteo-villosa, ceterum glabra, lobis late ovatis. Filamenta omnia usque ad basin lana e sicco pallide flava tecta. Antherae parvae, reniformes, non decurrentes. Ovarium lana densa argenteum. Capsula ignota.*

Species ex exemplari unico a rev. Fr. Anastasio Cadell, ordinis Capucinorum missionario, in agro ad oppidum Malatia Armeiae Turcicae lecto et mihi communicato descripta, capsulis deficientibus imperfecte nota, indumento argenteo, ad folia basalia fere gossypino, floccoso, in omnibus partibus sed praecipue ad caules, calyces et corollas detersili et cito evanido, insignis. (No. 1932.)

V. *sinuatum* L. *Judaea*: Wâdi el-Kelt prope Jericho, alt. ca. -200 m, 30. III. 1909 (No. 1956), 'Ain Duk prope Jericho, alt. ca. -250 m. 31. III. 1909 (No. 1957). *Mesopotamia*: ad Kasr Nakib prope Bardâd, in deserto limoso, 27. IV. 1910 (No. 1937); ad Babylonem leg. Dr. Reuter

(No. 1936). *Kurdistania Turcica* (Assyria): ad pagum Matâra inter Hanikîn et Kerkuk, in steppa alt. ca. 200 m. 14. V. 1910 (No. 1944).

V. rotundifolium Post. *Judea*: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, alt. ca. 400 m. 18. V. 1909 No. 1953).

V. fruticulosum Post. *Moab*: Mkâwer (Méâwer, Mucaurus) dit. Mâdaba, inter rupes calcar. aridas alt. ca. 800 m. 12. VI. 1909 (No. 1954).

V. speciosum Schrad. *Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari*: mons Siares supra pagum Hašîtha dit. Gülamerik, in humosis alt. ca. 1700 m. 19. VI. 1910 (No. 2019); mons Marga Masaga inter pagos Hoz et Chômar (dit. Amadia—Šattak), in humosis subhumidis alt. ca. 1900 m. 30. VII. 1910 (No. 2011). *Taurus Armenus*: Warak-Dar prope Wan, alt. ca. 2000 m. 23. VIII. 1910 (No. 1945).

V. cheiranthifolium Boiss. *Taurus Armenus*: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in humosis alt. ca. 2000 m. I. VIII. 1910 (No. 2024).

V. Mesopotamicum Boiss. *Kurdistania Turcica* (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel, ad septentr. ab oppido Môşul, in fissuris rupium calcar. aridarum alt. ca. 700 m. 10. VI. 1910 (No. 1934).

V. Arbelense Bornm. [Bornmüller, Allgem. Botan. Zeitschr. XIII. (1907), pag. 95.] *Corollae faux et filamentorum lana violacea*. *Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor*: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 950 m. 21 V. 1910 (No. 1951); ad pagum Dêr Harîr eiusdem ditionis, alt. ca. 650 m. 26. V. 1910 (No. 1935, 1939, 1950). Ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel ad septentr. ab oppido Môşul, ad rupes calcar. aridas alt. ca. 600 m. 10. VI. 1910 (No. 1952).

V. Tiberiadis Boiss. *Galilaea*: 'Ain Tîne et 'Ain Tabra (Tabîra) prope Tiberiadem, inter rupes calcar. ad fontes alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 1940 et 1941).

V. Aleppense Benth. *Kurdistania Turcica* (Assyria): Ĝebel Hamîn inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 m. 2. V. 1910 (No. 1947); ad pagum Matâra inter Hanikîn et Kerkuk, in steppa alt. ca. 200 m. 14. V. 1910 (No. 1948).

Verbascum pseudo-Digitalis Nábělek sp. nova [Tab. II, fig. 2, pag. 32, fig. 7.] Sect. *Lychnitis* Bth. § *Blattarioidea* Bth. sensu Boiss. *Perenne, radice pluricipiti. Caules herbacei, basi simplices, ad inflorescentiae basin parce ramosi, ca. 80 cm alti et basi ca. 8 mm crassi, recti, obtuse pluriangulati, sicut tota planta pilis stellatis, breviter candelabriglobis, detersilibus, primum crebris canescentes, tum glabrescentes, purpureo-brunnei, eglandulosi. Folia tenuia, rosulata in petiolum 7—9 cm longum, supra canaliculatum, abrupte attenuata aut basi rotundata, ovata aut ovato-lanceolata, acutiuscula, in margine grosse et irregulariter crenata, nervis subtus prominulis et pube densiore cinerea praeditis percursa, griseo-viridia, sine petiolo usque 16 cm longa et 7 cm lata. Folia caulin a oblongo-lanceolata, in petiolum sensim attenuata,*

acuminata, acuta, inferiora grosse ercnata, superiora subintegra, sursum decrescentia, infima longissime petiolata, petiolo usque 13 cm longo laminae longitudinem superante suffulta, superiorum petiolis cito decrescentibus summa sessilia, basi attenuata, non decurrentia. Bracteae anguste linear-i-lanceolatae, acutissimae, integrae, usque 3 cm longae et 2 mm latae, calyces 3-usque 4-plo superantes, caducae. Flores solitarii, sessiles aut brevissime pedicellati (pedicellis usque 2 mm longis), ad caulis et ramorum apices congesti, infra remoti. Calyces densissime cinerco-tomentosi, 6—8 mm longi, in dentes linear-i-lanceolatos, acutos, extus subcarinatos, usque ad basin fere fissi. Corolla aureae, mediocres, ca 2·5 cm diametro metentes, lobis late rotundato-obovatis, subrctisis, in fauce nudae, extus in alabastro pube stellata, densa cinereae, evolutae glabrescentes. Filamenta ad basin nuda, ceterum lana (ex adnotione ad vivum) aurea teeta. Antherae subaequales, parvae, reniformes. Ovarium florendi tempore globosum, dense stellatim tomentosum. Capsula ignota.

Habitus Verbascum digitalifolium Boiss. et Hsskn. referens, a quo praeter ceteras notas inflorescentiis parce ramosis nec thyrsoideis, foliis caulinis basi angustatis, numquam semiamplexicaulibus, bracteis multo longioribus, pedicellis brevioribus aut nullis, filamentis aureo nec violaceo-lanatis etc. differt.

Legi in Kurdistania Persica supra pagum Režāb dit. Kasr-i-Širīn, inter frutices quercuum alt. ca. 1200—1500 m. 5. V. 1910 (No. 1933 et 2040). Specimina Kotschyana ex Persia australi No. 805, 832 et 835, loco non indicato, in Boiss. Fl. Orient. non citata, cum specim. meis congruentia.

Celsia Bornmülleri Murbeck (Monogr. p. 182). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Gabenerik dit. Amadia. 22. VI. 1910 (No. 1946); Kurdistaniae distr. Hakkiari: mons Choarra Sia supra pagum 'Ain Nūne inter Aradēn et Hašītha, alt. ca. 1600 m. (determ. incerta). 16. VI. 1910 (No. 1998). — Determinavit cl. Dr. Sv. Murbeck.

C. lanceolata Vent. Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerūn (Deh-i-Loran), ad terram sabulosam. *Forma foliis inferioribus profunde sinuato-lobatis, fere runcinatis, pedicellis elongatis, florendi tempore quam calyces usque quadruplo longioribus, usque 15 mm longis, bracteis linear-i-lanceolatis, pedicelli dimidium attingentibus, corolla maiuscula, usque 15 mm diametro tenente.* 26. III. 1910 (No. 1939). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Salahije (Kifri) inter Hanikin et Kerkuk, ad rupes gypsaceas Šēch Zoar alt. ca. 300 m. *Forma caulinis abbreviatis, foliis minus profunde incisis, pedicellis brevioribus, florendi tempore ca. 5 mm, fructiferis usque 8 mm longis, bracteis parris, linear-i-lanceolatis, pedicelli dimidium rix attingentibus, floribus subminoribus, ca. 10 mm largis.* 10. V. 1910 (No. 1938).

C. heterophylla Desf. Judaea: El-Rōr ad Jordanem fluvium prope Jericho, alt. ca. -350 m. 15. IV. 1909 (No. 1963). Galilaea: 'Ain

Tîne prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. - 200 m. 22. IV. 1909 (No. 1962). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Baba Ğiğik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, ad rivulum alt. ca. 650 m, 21. V. 1910 (No. 1961); ad pagum Dêr Harîr dit. Erbil, ad rivulum alt. ca. 600 m, 21. V. 1910 (No. 1960); in glarea rivi Nahr Astêre prope Dêr Harîr (No. 1964). Mesopotamia: in silvula salicu[m] et Populi Euphratici in ripa Tigridis infra Môşul, alt. ca. 250 m. 30. V. 1910 (No. 1959).

C. Orientalis L. Galilaea: 'Ain Tabra (Et-Tabira) prope Tiberiadem, in rupestribus alt. ca. -200 m (forma nana), 22. IV. 1909 (No. 1965); ad oppidum Şafed, in rupestribus alt. ca. 800 m. 23. IV. 1909 (No. 1966). Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Puşt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran). 25. III. 1910 (No. 1967).

C. aurea C. Koch. [*Flores odorati.*] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Marga Masaga inter pagos Hoz et Chômar dit. Amadia — Şattak, in humosis humidis alt. ca. 1900 m. 30. VII. 1910 (No. 2009). Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in humosis alt. ca. 2200 m, 23. VIII. 1910 (No. 2001); ad pagum Nardônes in monte Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in humosis subhumidis alt. ca. 2000 m. 1. IX. 1910 (No. 1958).

Anarrhinum Orientale Bnth. Judaea: ad pagum Bittîr dit. Hierosolymorum, in rupestribus alt. ca. 600 m. 3. VI. 1909 (No. 76). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 68).

Linaria floribunda Boiss. Desertum Judaicum inter Bethlehem et 'Ain Ğidi (Engaddi), ad terram nudam alt. ca. 350 m. 26. V. 1909 (No. 1907). Arabia Petraea: Ĝebel Hârûn (Hor) supra Wâdi Mûsa (Petra), in fissuris rupium arenacearum alt. ca. 1200 m. 19. VI. 1909 (No. 1908).

L. pyramidata (Lam.) Spr. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in humosis alt. ca. 1900 m. 23. VIII. 1910 (No. 2004).

L. Kurdica Boiss. et Hoh. Mesopotamia superior, Ĝebel et-Tur (Tur Abdîn): ad pagum Dêrendeb ad septentr. ab oppido Midiat, in agris alt. ca. 650 m. 10. VII. 1910 (No. 2034). Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ĝezîret-ibn-Ômar, in rupestribus alt. ca. 2100 m. 25. VII. 1910 (No. 2008). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Şattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 m. 1. VIII. 1910 (No. 2026); in monte Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in humosis alt. ca. 2500 m. 30. VIII. 1910 (No. 1920). Armenia Turcica: supra pagum Čabachčûr inter Muš et Charput, alt. ca. 1700 m. 30. IX. 1910 (No. 2028).

L. arvensis (L.) Desf. (*Forma corollis pallide caeruleis.*) Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Şeletat prope Buşir, in agris inter segetes. 9. III. 1910 (No. 1912).

L. genistifolia (L.) Mill. var. linifolia Boiss. Armenia Tur-

cica: Wan, ad rupes calcar. castelli, alt. ca. 1850 m. 19. VIII. 1910 (No. 2013).

L. Chalepensis (L.) Mill. *Judaea*: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad terram nudam alt. ca. -200 m. 14. IV. 1909 (No. 1914). Palaestina orientalis (Gilead): ad pagum Ģeraš (Gerasa), in agris inter segetes alt. ca. 500 m. 19. IV. 1909 (No. 1915). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Šelelat dit. Šuštar, in agris. 9. III. 1910 (No. 1913).

L. Haelava (Forsk.) *Chav. Judaea*: Jericho, ad terram nudam aridissimam alt. ca. -300 m. 19. III. 1909 (No. 1921).

Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mzt. (= *Linaria lanigera* Desf.) *Arabia Petraea*: in deserto lapidoso ad Ma'ân, 21. VI. 1909 (No. 1919). *Armenia Turcica*: ad pagum Chošmat inter Muš et Charput (Mezre), frequens in agris alt. ca. 1300 m. 1. X. 1910 (No. 2027).

K. Sieberi (Rehb.) Derfl. (= *Linaria Sieberi* Rehb., *L. Elatine* var. *villoso* Boiss.) *Mesopotamia*: Kasr Nakib prope Bardâd, in agris. 27. IV. 1910 (No. 1923).

K. Aegyptiaca (L.) Nábělek comb. nova [= *Linaria Aegyptiaca* (L.) Dum.] *Judaea*: Jericho, in lapidosis aridis alt. ca. -300 m. 19. III. 1909 (No. 1917); Wâdi el-Kelt, ad rupes ad monasterium St. Cosibae inter Hierosolyma et Jericho, alt. ca. -50 m. 14. IV. 1909 (No. 1918); ad pagum Aslin dit. Hierosolymorum, inter rupes alt. ca. 500 m. 6. IV. 1909 (No. 1916). Ģebel Mâr Elias (Karmel), in rupestribus ad El-Muchraka alt. ca. 500 m. 2. V. 1909 (No. 1910).

Antirrhinum Orontium L. *Judaea*: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, in agris inter segetes alt. ca. 500 m. 2. IV. 1909 (Nr. 1903). Galilaea: 'Ain Tabra (et-Tabira) ad Tiberiadem, inter segetes alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 1904); Ģebel Mâr Elias (Karmel): inter rupes in fruticetis ad El-Muchraka, alt. ca. 500 m. 2. V. 1909 (No. 1905). Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), in steppa. 25. III. 1910 (No. 1906).

A. Orontium L. var. *parviflorum* (Lange) Batt. = *A. parviflorum* Lange [Pugillus plantarum imprimis hispanicarum III. 1863] = *A. microcarpum* Pomel [Nouveaux materiaux pour la flore atlantique 1874]. 'Ain Ģidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, ad rivulum alt. ca. -300 m. 26. V. 1909. (No. 1922).

A. tortuosum Boiss. Palaestina borealis: ad pagum Bâniyas (Caesarea Philippi), ad radices montis Hermonis, ad rupes alt. ca. 700 m. 26. IV. 1909 (No. 1902).

Antirrhinum Ceratotheca Nábělek sp. nova. [Tab. III, fig. 4, pag. 32, fig. 7.] *Annum, radice firma, subsimplici, inter lapides perpendiculariter descendente, flava. Caulis humilis, firmus, a basi divaricatim crebre ramosus, fere a basi foliatus et florifer, pilis glanduliferis parce hirtellus, ramis firmis, brevibus, infimis fere horizontalibus, apice tantum ascendentibus, globulos densos ca. 3—5 cm altos formans. Folia oblonga,*

obtusa, basi longe attenuata, integerrima, crassiuscula, glabra, ad basin canaliculatam, tandem induratum, parce piloso-glandulosa, supra viridia, subtus saepe violacea, inferiora usque 3·5 cm longa et 5–7 mm lata, superiora sensim diminuta, omnia fere in axillis flores gerentia. Flores solitarii, parvi, sessiles. Calyx usque ad basin fissi laciniae oblongo-lineares, obtusae, breviter glanduloso-hirtellae, tum glabrescentes, corollae dimidium rix attingentes, florendi tempore 5–6 mm longae, post anthesin valde accretae, basi induratae, subcarinatae, demum usque 25 mm longae, foliis fulcrantibus similes et iis paulum breviores. Corolla ca. 11 mm longa, parce piloso-glandulosa, basi brevissime saccata, labio superiore profunde bifido, inferiore brevius trifido, laciinis omnibus obtusis, diu persistens et sicca capsulam immaturam tegens. Labium superius et inferioris laciniae caeruleae, palatum aurantiacum, tubus albus, in parte inferiore intus lineis duabus aurantiacis ornatus. Capsula recta, fere cylindrica, subquadrigula, loculis fere aequalibus, polyspermis, mucrone brevi, duro,




Fig. 7.

Del. Dr. Fr. Nábólek.

1–4. *Antirrhinum Ceratotheca* Nk. 1. Capsula ca. $2\frac{1}{2}$ mm, 2. flos ca. $1\frac{1}{2}$ mm, 3. semen ca. $10/1$.
4. calyx cum folio fulcrante ca. $1/1$. 5. *Verbascum pseudo-Digitalis* Nk., calyx.

triangulari, acuto, 1–1·5 mm longo, terminata, parce glanduloso-pilosa, tum glabrescens. nondum matura mucrone excepto ca. 8 mm longa et 5 mm lata. Loculi probabiliter poris unicis dehiscentes. Semina nondum perfecte matura nigra, cylindrico-obovata, apice subtruncata, levia, non foveolato-cristata, dense glanduloso-hirtella.

*Capsulis fere rectis, mucronatis, loculis fere aequalibus, seminibus cylindrico-obovatis, levibus, glanduloso-hirtellis, calycibus post anthesin valde accrescentibus etc. omnibus sectionibus alienum sectionem novam *Ceratotheca* m. format.*

Crescit in Kurdistania Persica ad oppidum Kasr-i-Sirîn dit. Hanikîn, in lapidosis calcar. siccis alt. ca. 400 m. Legi 3. V. 1910 (No. 1914).

Serophularia chrysantha Jaub. et Spach. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in humosis alt. ca. 2650 m. 23. VIII. 1910 (No. 2005).

S. crenophila Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, in pratis humidis alt. ca. 1450–1500 m. 17. VI. 1910 (No. 1996).

S. alata Gilib. Moab: 'Ajûn Mûsa in latere occident. montis Nebo dit. Mâdaba, alt. ca. 600 m. 10. VI. 1909 (No. 1895). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Bervari: ad pagum 'Ain Nûne inter Aradêن et Hašîtha, ad fossam irrigationis alt. ca. 1200 m [var. *cordata* Boiss.] 21. VI. 1910 (No. 2020).

S. Michoniana Coss. et Kral. *Judaea*: ad pagum Abu Rôš dit. Hierosolymorum, in lapidosis alt. ca. 600 m. 2. IV. 1909 (No. 1894).

S. pulverulenta Boiss. et Noë, *Taurus Armenus*: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in fissuris rupium alt. ca. 1900 m. 1. VIII. 1910 (No. 2025).

S. Olympia Boiss. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter Amadia et Šattak, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2750 m. 28. VII. 1910 (No. 2015).

S. xanthoglossa Boiss. α *genuina* Boiss. *Judaea*: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 700 m. 22. III. 1909 (No. 1900).

S. xanthoglossa Boiss. β *decipiens* Boiss. *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): ad fluv. Čekâb inter Susa et Deilerûn (Deh-i-Loran), in steppa. 22. III. 1910 (No. 1901). *Kurdistania Persica*: supra pagum Režâb dit. Қasr-i-Şirîn, in humosis alt. ca. 1200 m. 5. V. 1910 (No. 1897). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: in steppa inter pagos Dêr Harîr et Baba Giğik dit. Erbil (Arbela) — Rewandûz, alt. ca. 680 m. 20. V. 1910 (No. 1898).

S. Libanotica Boiss. = *S. variegata* M. B. var. *Libanotica* Boiss. [cf. Bornmüller, *Plantae Straussianae*, Beih. botan. Centralbl. XXII. 2 (1907) pag. 109 [Fig. 9, pag. 40]. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Bervari: in valle Sapna inter Zacho (Azach) et Amadia, ad pontem in lapidosis alt. ca. 600 m. 15. VI. 1910 (No. 2016); supra pagum Aradêن dit. Amadia, ad fontem alt. ca. 1450 m. 15. VI. 1910 (No. 1899). *Kurdist. Turc.* distr. Hakkiari: mons Dwile supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in rupestribus alt. ca. 2100 m. 18. VI. 1910 (No. 2012); mons Siares supra pagum Hašîtha, alt. ca. 1700 m. 19. VI. 1910 (No. 1896) No. 2012 et 1896 formae caulibus et foliis caeruleis.

Veronica *Anagallis* L. *Palaestina septentrionalis*: Bâniás (Caesarea Philippi), ad rivum. 26. IV. 1909 (No. 1978). *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): in paludibus ad ruinas Susorum. 17. III. 1910 (No. 1980). Mesopotamia: Môşul, in silvulis salicu姆 et Populi Euphratici in ripa Tigridis. 30. V. 1910 (No. 1987).

V. anagalloides Guss. *Arabia Petraea*: Seil ed-Drâ inter El-Kerak et Et-Tafîle, ad rivulum alt. ca. 400 m. 15. VI. 1909 (No. 1979).

V. Velenovskýi Uechtr. [Engl. Bot. Jahrb. VIII, Literaturber. p. 46]. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkiari: ad pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in pratis humidis alt. ca. 1400 m. 17. VI. 1910 (No. 1997), Armenia Turcica: in glarea rivi Gök-Su inter oppida Charput (Mezere) et Mar'aš alt. ca. 900 m. 10. X. 1910 (No. 2029).

V. *Beccabunga* L. var. *muscosa* Korschinski.¹ *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkiari: supra pagum Hašitha dit. Čulamerik, inter muscos ad fontem alt. ca. 1700 m. 18. VI. 1910 (No. 2022); Čelo-Dar dit. Čulamerik: ad tentoria aestiva Djezra, ad nives tabescentes alt. ca. 2750 m. 3. IX. 1910 (No. 1984). Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, ad nives alt. ca. 2700 m. 31. VIII. 1910 (No. 1983).

V. *Orientalis* Mill. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Bervari: supra pagum Aradēn inter Amadia et Hašitha, in rupestribus alt. ca. 1500 m. 15. VI. 1910 (No. 1985). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 1986).

V. *Kurdica* Benth. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkiari: mons Dwile supra pagum Hašitha, inter rupes alt. ca. 2300 m. 18. VI. 1910 (Nr. 1982); mons Kēla Mame supra pagum Hoz inter pagos Amadia et Šattak, inter rupes alt. ca. 2700 m. 28. VII. 1910 (No. 1981).

V. *polifolia* Benth. Arabia Petraea: El-Hôr prope Petram (Wâdi Mûsa), in rupestribus alt. ca. 900 m. 18. VI. 1909 (No. 1988).

V. *Aleppica* Boiss. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in lapidosis alt. ca. 1600 m, 22. V. 1910 (No. 2030); Handrian-Dar supra Rewandûz, alt. 1800—2000 m. 23. V. 1910 (No. 2031). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Bervari: supra pagum Aradēn dit. Amadia, inter rupes alt. ca. 1500 m, 15. VI. 1910 (No. 2000); ad pagum 'Ain Nûne inter Aradēn et Amadia, alt. ca. 1200 m. 16. VI. 1910 (No. 2017).

V. *gentianoides* Vahl. var. *nova glacialis* m. [Tab. VII, fig. 5.] Caules abbreviati, 5—7 cm alti, folia caulina pauca, parva, bracteae pedicellis infimis subaequilongae, superioribus ca. duplo breviores. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Čezîret-ibn-Ômar, ad nives tabescentes alt. ca. 2500 m, 25. VII. 1910 (No. 2007); districtus Hakkiari: mons Kēla Mame supra pagum Hoz inter Hašitha et Šattak, ad nives alt. ca. 2600 m. 28. VII. 1910 (No. 2010).

V. *acrinifolia* L. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in agris alt. ca. 900 m. 21. V. 1910 (No. 1976).

V. *viscosa* Boiss. *Kurdistania Persica*: supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in graminosis alt. ca. 1800 m. 5. V. 1910 (No. 2037). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: Handrian-Dar supra Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in graminosis alt. ca. 1900 m. 23. V. 1910 (No. 2043).

V. *Syriaca* Roem. et Schm. *Judea*: Wâdi es-Sunnâr dit. Hierosolymorum, in lapidosis et in agris alt. ca. 750 m. 25. III. 1909 (No. 1975).

V. *intercedens* Bornm. [Bornmüller: *Plantae Straussiana*, Beih. Botan. Centralbl. XX/2 (1907), pag. 112]. *Kurdistaniae Turcicae* distr.

¹ Determ. cl. J. Bornmüller.

Hakkiari: mons Siares prope pagum Hašītha dit. Čulamerik, in graminosis alt. ca. 1800 m. 19. VI. 1910 (No. 1977).

V. polita Fr. ssp. *Tellungiana* Lehm. *Judea*: Hierosolyma, in hortis alt. ca. 750 m. 12. IV. 1909 (No. 1972). Mesopotamia: Babylon, ad fossas irrigationis. 18. IV. 1910 (No. 1970). *Persia australis*: ad pagum Ahrāmi dit. Bušr (Abu Šehr), in agris. 16. II. 1910 (No. 1971).

V. agrestis L. (*Forma nana aprica*). *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): ad pagum Šelelat dit. Šuštar, ad terram nudam sabulosam, 9. III. 1910 (No. 1973); ad pagum Kaunak (*Kônak*) inter Šuštar et Dizfûl, sub Zizypho nummul. 12. III. 1910 (No. 1974).

V. cymbalaria Bod. *Kurdistania Persica*: ad pagum Režāb dit. Kasr-i-Širîn, in graminosis et rupestribus alt. 900—1800 m. 4. V. 1910 (No. 2038).

Bungea trifida (Vahl.) C. A. Mey. *Kurdistaniae Turcicae distr.* Hakkiari: mons Siares prope pagum Hašītha dit. Čulamerik, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1600 m. 19. VI. 1910 (No. 1929).

Euphrasia Tatarica Fisch. *Armenia Turcica*: Warak-Dar prope Wan: ad rivulum prope monasterium Werin-Warak alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 2002). *Taurus Armenus*: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in pascuis alpinis humidis alt. ca. 2700 m. *Forma nana caulinis 1.5—5 cm longis*. 31. VIII. 1910 (No. 2014). *Kurdistaniae Turcicae distr.* Hakkiari: ad pagum Chômar dit. Šattak: in pascuis alpinis alt. ca. 2300 m. 30. VII. 1910 (No. 1991).

Parentucellia latifolia (L.) Carr. [= *Euphragia latifolia* (L.) Griseb]. *Judea*: Hierosolyma, Haram eš-Šerîf, alt. ca. 750 m. 20. III. 1909 (No. 1928). *Galilaea*: in steppa inter Šafed et Kefr Birîn, alt. ca. 800 m. 24. V. 1909 (No. 1924).

P. latifolia (L.) Carr. ssp. *flaviflora* (Boiss.) Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotam. pag. 406] = *Euphragia latifolia* (L.) Griseb. β *flaviflora* Boiss. *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) ad Deilerûn (Deh-i-Loran), in lapidosis copiosissima. 25. III. 1910 (No. 1930). *Kurdistania Persica*: ad pagum Režāb dit. Kasr-i-Širîn, in graminosis alt. ca. 900 m. 4. V. 1910 (No. 2041).

P. viscosa (L.) Carr. [= *Euphragia viscosa* (L.) Rchb.] *Galilaea*: in graminosis humidis ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) in planicie Esdrelon inter Nazaret et Ĝenîn. 5. V. 1909 (No. 1926).

Trixago Apula (L.) Stev. (= *Bartsia Trixago* L.) *Palaestina orientalis* (Gilead): Wâdi el Arab inter El-Hösn et Semach (ad lacum Tiberiadis), alt. ca. 150 m. 20. IV. 1909 (No. 1925). *Palaestina septentrionalis*: Tell el-Ķadi prope Bâniyas (Caesarea Philippi), in graminosis humidis. 25. IV. 1909 (No. 1927). *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): ad rivum inter pagos Maltai et Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môşul, alt. ca. 350 m. 6. VI. 1910 (No. 2021).

Orthantha Aucheri (Boiss.) Wettst. [Wettstein in Engl. u. Prtl. Nat. Pflanzenfam., IV. 3b, pag. 101] = **Odontites Aucheri** Boiss. *Kurdistaniae Turcicae distr.* Hakkiari: mons Bestabije prope pagum Hoz dit. Haşîtha—Şattak, in graminosis aridis alt. ca. 1600 m. 27. VII. 1910 (No. 1989). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Şattak et Wan, in graminosis alt. ca. 1850 m. 1. VIII. 1910 (No. 1990). Warak-Dar prope Wan: ad monasterium Werin-Warak, in graminosis ad rivum alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 1991).




Fig. 8.

Del. Dr. Fr. Nábělek

Rhynchocorys Kurdicus Nk. (Corolla, calyx ca. $\frac{4}{1}$, folia ca. $\frac{1}{1}$.)

Rhynchocorys Kurdicus Nábělek sp. nova. [Tab. I, fig. 4, pag. 36, fig. 8.] *Perennis, radice verisimiliter tuberosa, totus molliter hirsutus et glandulosus. Caulis elatus, firmus, rectus, in solum longe descendens, in parte subterranea squamiger, atro-purpureus, deorsum sensim attenuatus, sursum foliatus, usque ad medium fere simplicissimus, tum ramis brevibus, strictis thyrsideo-ramosus, plurisulcatus, cum parte hypogaea 50—80 cm altus, parte subterranea 10—15 cm longa, ad solum ca. 5—8 mm crassus. Folia infima florendi tempore iam evanida, inferiora sessilia, e basi cordata, caulem subamplectente, longe acuminata, acuta, integra, aut ad basin crenis paucis irregularibus praedita, 3·5—4 cm longa et ca. 2 cm lata. Folia superiora, in axillis ramos gerentia, e basi rotundata longius acuminata, basin versus irregulariter crenato-dentata, ca. 3·5 cm longa et 10—12 mm lata, interdum brevissime petiolata, sursum in bracteas sensim transeuntia. Bracteae brevissime petiolatae, e basi ovata longe*

acuminatae, acutae, integrae, flores aequantes, ca. 15 mm longae et 5 mm latue. Flores in bractearum axillis solitarii, oppositi, non secundi, breviter pedicellati, pedicellis ca. 2 mm longis, tenuibus, racemos sursum densos, inferne laxiusculos formantes. Calycis ca. 10 mm longi, molliter hirsuti et glandulosi, labium superius simplex, acutum, non bidentatum neque retusum, inferius, subbrevis; profunde bifidum, dentibus acutissimis. Corolla aureae, parce hirtellae et glandulosae, galea infra medium abrupte sursum inflexa et superne gibba, in rostrum subulatum, rectum, supra basin dentibus duobus instructum, abrupte transiens, labium inferius amplum, galeam aequans, orbiculatum, undulatum, vix trilobum. Capsula ignota.

Rhynchocorydi *Elephas* L. affinis esse videtur, a cuius formis differt statura multo robustiore, caulis rectis, firmis, non flaccidis, basi simplicibus, foliis integroribus, angustioribus, acutioribus, brevius pedunculatis, inferioribus sessilibus.

Crescit in *Kurdistaniae Turcicae* distr. *Ramorân*, in monte *Halakur-Dar* ad septentr. ab oppido *GeViret-ibn-Ômar*, in humosis lapidosis alt. ca. 2300 m. Legi 26. VII. 1910 (No. 1459).

Pedicularis comosa L. var. *acomodonta* Boiss. *Taurus Armenus*: *Warak-Dar* prope *Wan*, ad monasterium *Werin-Warak*, ad rivum alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 2003).

Orobanchaceae.

Phelipaea coccinea (M. B.) Poir. — *Anoplanthus coccineus* (M. B.) Walp. *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): ad pagum *Mâr Jakub* supra pagum *Simel* ad septentr. ab oppido *Môşul*, in steppa alt. ca. 700 m. 7. VI. 1910 (No. 744).

Orobanche lavandulacea Rehb. [= *Phelipaea lavandulacea* (Rehb.) Reut.] *Corolla ex vivo azurea, basi albida; stigma pallide flavum, bracteae et calyx saepe violaceo-suffusus*. *Kurdistania Persica*: supra pagum *Režâb* dit. *Ķasr-i-Širîn*, alt. ca. 1100 m, ad *Brachypodium distachyum*. 5. V. 1910 (No. 745); supra pagum *Sar-i-Pûl* dit. *Ķasr-i-Širîn*, alt. ca. 800 m, ad *Onosma albo-roseum*. 6. V. 1910 (No. 727). *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): ad pagum *Mâr Jakub* supra pagum *Simel* ad septentr. ab oppido *Môşul*, in olivetis alt. ca. 700 m. 9. VI. 1910 (No. 742). *Kurdistania Turcica*, distr. *Berwari*: mons *Choarra Sia* supra pagum *'Ain Nûne* inter *Hašîtha* et *Amadia*, in graminosis alt. ca. 1500 m, 16. VI. 1910 (No. 1999); ibidem alt. ca. 1500 m ad *Pterocephalum pyrethrifolium*. 16. VI. 1910 (No. 1999a).

O. Aegyptiaca Pers. [= *Phelipaea Aegyptiaca* Walp.] *Judea*: *Jericho*, ad *Solanum Lycopersicum*, alt. ca. -300 m, 18. III. 1909 (No. 738); ad pagum *Latrûn* dit. *Hierosolymorum*, ad *Catananche lutea* m, alt. ca. 350 m. 2. IV. 1909 (No. 737). *Palaestina borealis*: ad

pagum Bâniás (Caesarea Philippi), alt. ca. 700 m. 26. IV. 1909 (No. 734). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad fluvium Čekâb inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran) in deserto subsalso ad Plantaginem Haussknechti copiosa. 24. III. 1910 (No. 739). Kurdistaniae Turcicæ distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), ad Phlomidem Orientalem alt. ca. 1200 m. 22. V. 1910 (No. 728). Kurdist. Turc. distr. Hakkiari: mons Siares prope pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik, ad Phlomidis sp. ? alt. ca. 1750 m. 19. VI. 1910 (No. 725). Armenia Turcica: Mamuret-ül-Azîz (Charput), in agro ad Cucumidem sativam, alt. ca. 1050 m. 3. X. 1910 (No. 746).

O. Kurdica Boiss. et Hausskn. Kurdistaniae Turcicæ distr. Hakkiari: mons Dwîle supra pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik, inter frutices quercuum et inter Cachrydem prangoideum copiosa alt. ca. 2100 m. 18. VI. 1910 (No. 726); mons Siares eiusdem ditionis, ad Cachrydem prangoideum? alt. ca. 1700 m. 19. VI. 1910 (No. 743). Taurus Armenus: ad pagum Garaspi in monte Harefta inter Baškala et Kočânes ad Centauream Szowitsianam alt. ca. 2200 m. 1. IX. 1910 (No. 747).

O. crenata Forsk. (= O. speciosa DC.) El-Rôr prope Jericho, ad Ammi maius, alt. ca. -350 m. 15. IV. 1909 (No. 733). Wâdi Ĝeria inter Jericho et Arak el-Emîr, ad Ammi maius, alt. ca. 250 m. 15. IV. 1909 (No. 735). Galilaea: ad Tell Kades infra oppidum Şafed, ad Viciam fabam, alt. ca. 200 m. 25. IV. 1909 (No. 736); ad pagum Bâniás (Caesarea Philippi), ad Viciam Erviliam, alt. ca. 300 m. 26. IV. 1909 (No. 732).

O. cernua Löfl. var. Nepalensis Reut. (DC., Prodr. IX. p. 33; = O. cernua var. desertorum Beck). Arabia Petraea: El-Bêda prope Šôbak inter El-Kerak et Petram (Wâdi Mûsa), ad Artemisiae sp. alt. ca. 900 m. 18. VI. 1909 (No. 730). Kurdistania Turcica: ad pagum Matâra inter Hanikîn et Salahije (Kifri), ad Artemisiae sp., alt. ca. 200 m. 14. V. 1910 (No. 749).

O. maior L. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, ad Salviae sp. alt. ca. 1200 m. 5. V. 1910 (No. 729). Kurdistaniae Turcicæ distr. Ramorân: Halakur-Dar, ad septentriones ab oppido Ĝezîret-ibn-Ômar, alt. ca. 2300 m. 25. VII. 1910 (No. 748).

O. maior L. var. oreites Beck. Kurdistaniae Turcicæ distr. Hakkiari: mons Siares prope pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik, ad Polygonum alpestre alt. ca. 1700 m. 19. VI. 1910 (No. 741).

Cistanche lutea Lk. et Hffsg. = *Philipaea lutea* Desf. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad Atriplicem leucocladum alt. ca. -250 m. 30. III. 1909 (No. 750).

Acanthaceæ.

Blepharis edulis (Forsk.) Pers. Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, ad monasterium St. Cosibae. 14. IV. 1909 (No. 1992).

Acanthus *Dioscoridis* L. var. *grandiflorus* Bornm. (Mitt. d. Thür. Bot. Ver., n. F. VI, p. 67.) *Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari*: mons Siares prope pagum Hašītha dit. Ğulamerik, in lapidosis alt. ca 1500—1750 m. 19. VI. 1910 (No. 1993). *Kurdist. Ture. distr. Berwari*: ad pagum Mizurka prope Amadia, alt. ca. 900 m. 22. VI. 1910 (No. 1994); mons Rēša d'Amadia prope Amadia, alt. ca. 1800 m. 22. VI. 1910 (No. 2018).

A. Syriacus Boiss. *Judaea*: ad pagum Sa'ra (Sorea) dit. Hierosolymorum, in agro alt. ca. 500 m. 6. IV. 1909 (No. 1995).

Globulariaceae.

Globularia *Sintenisii* Hausskn. et Wettst. [Wettstein: *Globulariaceenstud.*, Bull. Herb. Boiss III., p. 274 (1895).] *Kurdistania Turcica*: Râs el-Hağar prope oppidum S'ert, in rupestribus alt. ca. 900 m. 14. VII. 1910 (No. 73). Ad pagum Mâr Goria dit. S'ert, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 900 m. 16. VII. 1910 (No. 74).

G. trichosanta Fisch. et Mey. *Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari*: mons Siares prope pagum Hašītha dit. Ğulamerik, in rupestribus alt. ca. 1800 m, 19. VI. 1910 (No. 784).

G. Arabica Jaub. et Sp. *Arabia Petraea*: Ğebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), in fissuris rupium arenacearum alt. ca. 1400 m. 19. VI. 1909 (No. 45).

Verbenaceae.

Lippia nodiflora (L.) Rich. *Persia austro-occidentalis (Susiana)*: ad ruinas Susorum, ad limum in ripis fluv. Šatîr frequens. 15. III. 1910 (No. 719). *Mesopotamia*: Babylon, frequens ad limum.

Verbena officinalis L. *Judaea*: Jericho, ad fossas irrigationis alt. ca. -300 m. 31. III. 1909 (No. 722). *Armenia Turcica*: ad pagum Čabachčûr inter Muš et Charput, in ruderatis alt. ca. 950 m. 29. IX. 1910 (No. 715).

V. supina L. *Mesopotamia*: Babylon, ad limum, leg. Dr. Reuter. Môşul: in silvula salicum et Populi Euphraticae in ripa Tigridis. 30. V. 1910 (No. 720).

Vitex Agnus Castus L. *Judaea*: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, alt. ca. 300 m. 18. V. 1909 (No. 718); Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, alt. ca. 150 m. 30. III. 1909 (No. 717). In planicie circa Jericho, El-Rôr dit. Jericho, in vallibus (Wâdi) Moabiticis et Arabiae Petraeae; 'Ain Tîne prope Tiberiadem, alt. ca. -200 m, 22. IV. 1909 (No. 716); ad Tell el-Kâdi prope Bâniyas (Caesarea Philippi) et ad Bâniyas alt. ca. 350 m.

V. Pseudo-Negundo (Hausskn.) Hand. Mzt. [= *V. Agnus castus* var. *Pseudo-Negundo* Hausskn., cf. Handel-Mazzetti: *Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotam.* . . . p. 408.] *Kurdistania Persica*: ad

Ķasr-i-Širin dit. Hanikín, in valle fluv. Helwán; Kurdistania Turcica: ad torrentes inter Hanikín, Salahíje (Kifri), Kerkuk, Erbil (Arbela); inter Erbil et Rewandûz; inter Môşul et Maltau, alt. ca. 450 m; ad Ĝezîret-ibn-Ômar; in valle Tigridis ad Hassan Kef; Kurdistaniae Turc. distr. Ramorân: in glarea vivi Ruzôr ad septentr. ab oppido Ĝezîret-ibn-Ômar, alt. ca. 600 m. 23. VII. 1910 (No. 1968); Syria borealis: ad oppidum Mar'aš alt. ca. 700 m, 14. X. 1910 (No. 1969).

Avicennia officinalis L. Sinus Persicus: insula Bahrein, ad oppidum Mênama, in litore limoso fruticulos vix 1 m altos formans. 8. II. 1910 (No. 93).

Labiatae.

Ocimum menthaefolium Hochst. var. **glabrum** m.
[Fig. 9, pag. 40.] *Folia crebre glanduloso-punctata, glabra, in margine*




Fig. 9.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—3. *Scrophularia Libanotica* Boiss. 1. flos ca. $2\frac{1}{2}$ /1, 2. folium ca. $1\frac{1}{2}$, 3. staminodium.
4—6. *Ocimum menthaefolium* Hochst. var. *glabrum* Nk.

solum parce ciliatula. Rami annotini et inflorescentiae axis, pedicelli et calyces patule pilosi et glandulosi. Corolla calyce plus duplo longior. Sinus Persicus: insula Bahrein, ad El-Edhari prope oppidum Mênama, ad viam, fruticulus ca. 1 m altus, odoratissimus. 11. II. 1910 (No. 1540).

Lavandula Stoechas L. Phoenicia: ad pagum Ekzib dit. Haifa, in rupestribus ad litus. 30. IV. 1909 (No. 1687).

L. pubescens Decaisne. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad rivulum alt. ca. -250 m, 30. III. 1909 (No. 721).

Mentha Sieberi K. Koch. El-Rôr prope Jericho, ad rivulos alt. ca. -350 m. 14. IV. 1909 (No. 1638). Moab: Wâdi Heidân inter Mâdaba et El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 300 m. 25. VI. 1909 (No. 1636).

M. mollis Ro ch. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad radices meridionales montis Halakur-Dař ad septentr. ab oppido Ĝezîret-ibn-Ômar, ad rivum alt. ca. 1400 m. 25. VII. 1910 (No. 1480). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkia: ad pagum Hoz inter Amadia et Šattak, ad rivulum

alt. ca. 1900 m. 28. VII. 1910 (No. 1603). Taurus Armenus: ad pagum Šattak, in ripa fluv. Bochtan, alt. ca. 1400 m. 30. VII. 1910 (No. 1594).

M. aquatica L. var. *Ortmanniana* (Opiz) Braun. Syria septentrionalis: ad ripas et in paludibus lacus Göl-Baš ad pagum Inatli inter oppida Malatia et Mar'aš, alt. ca. 1000 m frequentissima. 12. X. 1910 (No. 1568).

Lycopus Europaeus L. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: in silvula salicum inter pagos Hadîde et Godianos ad orientem ab oppido S'ert, alt. ca. 600 m. 27. VII. 1910 (No. 1612).

Origanum hirtum Link. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Grike ad orientem ab oppido S'ert, in fruticetis quericum alt. ca. 1200 m. 20. VII. 1910 (No. 1531).

O. Maru L. Judaea: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, in rupestribus alt. ca. 450 m. 18. IV. 1909 (No. 1647).

O. Majorana L. Libanon: in pineto ad pagum Brumâna supra Beirût, alt. ca. 750 m. X. 1909 (No. 1665).

Amaracus (*Origanum*) *Hausknechtii* (Boiss.) Briq. [Engl. et Prtl. Nat. Pflanzenfam. IV/3 a, pag. 306] var. *acutidens* Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopot. . . . pag. 420.] Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dař ad septentr. ab oppido Ğeziret-ibn-Ômar, inter rupes calcar. alt. ca. 2300—2400 m. 25. VII. 1910 (No. 1515).

Thymus Kotschyani Boiss. et Hoh. var. *glabrescens* Boiss. (= *Th. arthroclades* Stapf.) Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašitha, in lapidosis alt. ca. 900 m. 15. VI. 1910 (No. 1552, *flores pallide rosei*); mons Choarra Sia supra pagum 'Ain Nûne, ad rupes calcar. alt. ca. 1500 m. 16. VI. 1910 (No. 1521, *flores albi*). Districtus Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in saxosis alt. ca. 1400 m. Forma *caulibus suberectis, basi induratis, pulvinos densos formans*. *Flores albi*. 24. V. 1910 (No. 1572). Districtus Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter Hašitha et Šattak, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2500 m. Forma *caulibus brevibus, breviter puberulis, basi induratis tortuosis, foliis inferioribus glabris, superioribus ciliatis, calycibus et corollis pallide roseis, parce puberulis, glanduloso-punctatis*. 28. VII. 1910 (No. 1559). Districtus Berwari: Halakur-Dař ad septentriones ab oppido Ğeziret-ibn-Ômar, ad rupes calcar. alt. ca. 2500 m. Forma *humilis, caulibus induratis, tortuosis, rupibus adpressis, pubescentibus, foliis parvis, parce puberulis, dense glanduloso-punctatis, calycibus dense puberulis et punctatis, corollis pallide roseis, puberulis et punctatis*. 26. VII. 1910 (No. 1465).

Th. Kotschyani Boiss. et Hoh. var. *incanus* Bornmüller (Bull. Herb. Boiss. 1907, p. 978) [= *Th. Kotsch.* var. *vestitus* Hausskn. ined.]¹. Taurus Armenus: ad pagum Gurandašt inter Šattak et Wan, ad rupes graniticas alt. ca. 1850 m. I. VIII. 1910 (No. 1971).

¹ Det. cl. K. Ronninger.

Th. Kotschyanus Boiss. et Hoh. var. *nova Nábělekianus* Ronn. [Tab. VI, fig. 3, pag. 42, fig. 10.] *Suffruticosus, caulis tenuibus, procumbentibus aut ascendentibus, praesertim superne dense retrorsum pubescentibus, rubellis. Foliis omnibus in utraque facie puberulis, eis caulinum sterilium minus dense quam eis caulinum florentium. Foliorum forma variabilis: ea caulinum florentium plus minus late ovata, suborbiculata aut subcordata, obtusa, ca. 6 mm longa et 5 mm lata, ea caulinum sterilium anguste ovata, ovato-lanceolata et lanceolata, acutiuscula, parcus glandulosopunctata, 6 × 4 usque 8 × 5 mm longa et lata; summa capitula involucrantia. Floribus in capitula subglobosa congestis, magnis, calycibus usque 4.5 mm longis, dense et patule albido-hirsutis, non aut parcissime*




Fig. 10.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Thymus Kotschyanus Boiss. et Hoh. var. Nábělekianus Ronn. (ca. 3/4.)

punctatis, dentibus inferioribus rubellis. Corollis usque 9 mm longis, pallide roseis, hirsutis, tubo longe exerto. Differt a typo caulis procumbentibus, sterilibus repentinibus, rubellis, floribus maioribus, calycis dentibus rubellis, florum capitulis albido-hirsutis, foliis parcissime punctatis. Var. *eriocalyx* Ronninger (leg. Strauss ad Sultanabad 8./6. 1890 [Bot. Institut Wien]) varietati nostrae proxima, differt foliis maioribus et caulis sterilibus repentinibus nullis.

Legi in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Čelo Dař dit. Čulameric, ad tentoria aestiva Djezra, in fissuris rupium calcar. alt. 2800—2900 m. 3. IX. 1910 (No. 1472 et 1474).

T. Bowei Bth.¹ Arabia Petraea: in deserto lapidosa ad Ma'ān (specimina valde depasta). 21. VI. 1909 (No. 1683).

T. Syriacus Boiss. Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis inter pagos Tell Kef (Tell-is-Kof) et Malai ad septentr. ab oppido Môşul, alt. 350—400 m. 6. VI. 1910 (No. 1539).

¹ Det. cl. K. Ronninger.

T. capitatus (L.) Link et Hoffm. *Judaea*: Wâdi el-Ğôz prope Hierosolyma, in rupestribus alt. ca. 650 m. 18. VII. 1909 (No. 1670); inter 'Ain Ğidi (Engaddi) et Hebron, inter rupes calcar. alt. ca. 500 m. 26. V. 1909 (No. 1652); ad Hebron alt. ca. 800 m, 26. V. 1900 (No. 46 et 85).

Thymbra spicata L. *Judaea*: ad pagum Bittîr dit. Hierosolymorum, in saxoris alt. ca. 700 m. 3. VI. 1909 (No. 1658). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: colles aridi inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğiğik dit. Erbil (Arbela)—Revandûz, alt. ca. 680 m. 24. V. 1910 (No. 1625). *Assyria*: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel ad septentr. ab oppido Môşul, ad rupes calcar. alt. ca. 600 m. 27. VI. 1910 (No. 1508).

T. Sintenisii Bornm. et Aznavour [Fedde, Repert. X. p. 471 (1912)]. *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, ad rupes calcar. alt. 600—700 m. 27. VI. 1910 (No. 1509).

Zataria multiflora Boiss. *Persia australis*: Kuh Chormûğ dit. Bušîr, ad pagum Ahrâmi, et ad rupes calcar. ad cacumen montis. 17. et 18. II. 1910 (No. 70 et 1538).




Fig. 11.

Del. Dr. Fr. Nábělek

1. *Satureia macrantha* C. A. Mey. (ca. $\frac{3}{4}$ l.). 2. *Satureia hortensis* L. var. *speciosa* Nk (ca. $\frac{3}{4}$ l.). 3, 4. *Satureia florida* (Boiss.) Briq. (ca. $\frac{4}{5}$ l.). 5. *Ziziphora Ronningeri* Nk. (ca. $\frac{4}{5}$ l.). 6. *Ziziphora rigida* (Boiss.) Stapf. (ca. $\frac{4}{5}$ l.).

Satureia hortensis L. var. nova **speciosa** m. [Fig. 11, pag. 43.] Differt a typo *floribus maioribus, pallide roseis, usque 11 mm longis, bracteas ca. 8 mm longas superantibus, tubo calyce ca. 3·5 mm longo sub-duplo longiore, caulibus plerumque violaceo-suffusis, a basi crebre ramosis, ramis ascendentibus, florum glomerulis multifloris, summis in capitula ovato-globosa congestis.* Armenia Turcica: Sipikordagh, in glareosis (Sintenis, Iter orientale 1890, No. 3356, sub *S. laxiflora* C. Koch) Taurus Armenus: ad pagum Surp ad litus australe lacus Wan dit. Bitlis, ad solum vulcanicum alt. ca. 1900 m. 20. IX. 1910 (No. 1565). Armenia Turcica: in glarea rivi Gök-Su ad pagum Surgi inter Malatia et Mar'aš, alt. ca. 900 m. Specimina *robustiora, ramis suberectis, tota (caules et folia) atro-violacea.* 10. X. 1910 (No. 1567).

S. laxiflora K. Koch. Kurdistania Turcica (Assyria): in declivitatibus argilosis aridissimis ad pagum Chandük inter Hassan Kef (Hisn Keifa) et S'ert, alt. ca. 350 m frequentissima. 12. VII. 1910 (No. 1578).

S. macrantha C. A. Mey. [Fig. 11, pag. 43.] *Calyx hirsutior, cymi longius pedunculati, pluriflori ac in specim. originalibus Szovitsianis. Planta odoratissima.* Armenia Turcica: ad monasterium Surp Garabet dit. Muš, in rupestribus alt. ca. 1600 m. 28. IX. 1910 (No. 1566).

S. Bachtiarica Bge (?), non florens Persia australis: Kuh Chormûğ dit. Buşir (Abu Ŝehr), in rupestribus ad cacumen montis. 18. II. 1910 (No. 1622).

S. Thymbra L. Judaea: in lapidosis dit. Hierosolymorum frequens. Ad pagos Aslîn alt. ca. 450 m et Deir Abân alt. ca. 600 m, 6. IV. 1909 (No. 1657 et 1703).

S. nervosa Desf. [= *Micromeria nervosa* (Desf.) Benth.] Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in lapidosis, ad vias, ad margines agrorum frequens. 24. III. 1909 (No. 1698).

S. Julianæ L. var. *myrtifolia* Boiss. [= *M. Julianæ* (L.) Bth.] Galilæa: 'Ain Tabra (et-Tabira) dit. Genezareth, ad rupes alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 1677).

S. Graeca L. [*M. Graeca* (L.) Bth.] Moab: Měáwer (Mucaurus) inter Mâdaba et El-Kerak, ad rupes alt. ca. 900 m. 12. VI. 1909 (No. 1637).

S. Persica (Boiss.) Briq. (= *M. Persica* Boiss.) Kurdistania Persica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, ad rupes alt. ca. 600 m. 10. VI. 1910 (No. 1503).

Satureia flaccæ [*Micromeria flaccæ*] Nábélek sp. nova. [Tab. VI, fig. 2., pag. 45., fig. 12.] *Suffruticosa, patule hirtella, canescens. Radix lignosa, atro-fusca, in rupium fissuras descendens, multiceps, caules complices basi induratos, cortice flava, ligamentosa, obtectos, 15—30 cm longos, tenues, ascendentes vel rectos, basi indurata excepta foliosos, fragiles, edens. Folia omnia petiolata, petiolo foliorum inferiorum laminæ dimidium attingente, superiorum laminam subaequante, lamina late ovata, basi rotundata aut subcordata, in margine remote et obsolete paucidentata,*

acutiuscula, in utraque facie dense et molliter velutina, glanduloso-punctata, canescens, nervis subtus prominulis longius hirsutis, maxima ca 17 mm longa et 13 mm lata, intermedia 12×10 mm, floralia 7×4—2×1 mm. Cymae ex foliorum axillis orientes laxe dichotomae, inferiores pedunculo filiformi folium aequante, superiores id 2—3-plo superante, sutfultae, 5—7-florae. Bracteae minimae filiformes, calyce ca. duplo breviores. Flores breviter pedicellati; calyx ca. 3 mm longus, patule hirtellus et parce glanduloso-punctatus, dentibus triangularibus acutis tubo ca. quadruplo brevioribus. Corolla rosea, ca. 8 mm longa, calyce subtriplo longior, tubo longe exerto, limbi brevis labio superiore retuso, inferioris lobis lateralibus rotundatis, medio maiore obovato, retuso, utrimque crenata parva aucto, extus breviter tomentella. Nuculae atro-fuscae, oblongae, acutiusculae, dorso leves, ventre carinatae,




Fig. 12.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Satureia flacca Nk. (Flos ca. $\frac{1}{4}$, folia ca. $\frac{2}{1}$.)

brevissime albido-hirtellae. Tota planta aromatica. — Ex affinitate Satureiae (*Micromeriae*) mollis Bth. esse videtur, a qua differt praesertim caulis subrectis nec procumbentibus, longioribus, foliis basi rotundatis aut subcordatis, cymis plurifloris, calycis dentibus triangularibus, acutis nec lanceolatis, obtusiusculis, corolla maiore, indumento patulo nec tomentoso. Habitat in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Čelo-Dar dit. Čulamerik, in fissuris rupium calcar. in valle Hawaspi, alt. ca. 1600 m. Legi 6. IX. 1910 (No. 1491).

S. serpyllifolia (M. B.) Briq. var. *barbata* Boiss. [= *Micromeria serpyllifolia* (M. B.) Boiss. var.] *Judea: El-Kubebe (Emaus)* dit. *Hierosolymorum*, in rupestribus alt. ca. 700 m. 26. VII. 1909 (No. 1644).

S. florida (Boiss.) Briq. == *Calamintha florida* Boiss. [Fig. 11, pag. 43.] *Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Goria dit. Sert, ad rupes calcar. alt. ca. 1200 m.* 16. VII. 1910 (No. 1528).

Satureia staminea (Boiss.) Briq. [= *C. staminea* Boiss.]
Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, in valle
Hawaspi ad rupes calcar. alt. ca. 1600 m. 6. IX. 1910 (No. 1490).

S. vulgaris (L.) Fritsch (= *C. Clinopodium* Bth., Boiss.,
Clinopodium vulgare L.) Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari:
ad pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašîtha, in querceto alt. ca.
1200 m. 16. VI. 1910 (No. 1550).

Melissa officinalis L. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân:
ad pagum Tell Mişâr ad orientem ab oppido S'ert, in populeto ad
rivum alt. ca. 760 m. 18. VII. 1910 (No. 1611).

Ziziphora serpyllacea M. B. Taurus Armenus: Warak-Dar
prope Wan, ad rupes graniticas alt. 2500—2600 m. 23. VIII. 1910
(No. 1553).

Z. canescens M. B. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân:
Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, ad rupes calcar.
alt. ca. 2500 m. 26. VII. 1900 (No. 1458).

Z. rigida (Boiss.) Stapf. [Bot. Erg. der Polak-Exp. I. 39 (1885)],
forma *humilis*, *caulibus induratis plus minus tortuosis*. Taurus Armenus:
Warak-Dar prope Wan, ad rupes graniticas alt. ca. 2500 m (No. 1553) et
2600 m (No. 1597). 23. VIII. 1910.

Z. rigida (Boiss.) Stapf. [Fig. 11, pag. 43.] *Forma elata, caulibus*
basi tantum induratis, rectis, virgatis, tenuibus, usque 40 cm altis, suffruticosâ
subhemisphaericos formans. Flores pallide rosei. Taurus Armenus:
ad pagum Chômar in valle fluv. Bochtan dit. Šattak, in rupestribus
schistosis alt. ca. 1400 m. 31. VII. 1910 (No. 1466).

Ziziphora Ronningeri Nk. sp. nova. [Tab. III, fig. 3., pag. 43,
fig. 11.] *Suffruticosâ, caulibus sursum alte induratis, ascendentibus,*
usque 30 cm altis, ramosis, brevissime velutinis, fuscis, foliosis, in foliorum
axillis plerumque foliorum diminutorum fasciculos aut ramulos abbreviatos
gerentibus. Folia minutissime puberula, parce glanduloso-punctata, lanceolata,
acuta, in petiolum brevem attenuata, inferiora maiora, ca. 2 cm
longa et 0.5 cm lata, sursum diminuta, summa, florum capitula involu-
crantia, minima, ca. 10 mm longa et 1.5—2 mm lata. Flores in capi-
tula globosa, terminalia, multiflora (usque plus 100), congesti, pedicellis
calyce ca. dimidio brevioribus suffulti. Calyx anguste tubulosus, sub-
gibbus, dense et patule albido-hirsutus et parce glanduloso-punctatus,
ca. 7 mm longus, dentibus subaequalibus ca. 1 mm longis, lanceolatis,
acutis. Corollae perpallide roscae aut albae tubus ca. 8 mm longus,
tenuis, prorsus paullum curvatus, brevissime puberulus, labium superius
obovatum, retusum, inferius profunde trilobum, lobis lateralibus obovatis,
medio paullo longiore, retuso. Antherae breviter exsertae.

Ex affinitate proxima *Ziziphora rigidæ* (Boiss.) Stapf. esse
videtur, ad cuius formam elatam accedit. Differt ab ea caulibus magis
induratis, crassioribus, ramosis, ascendentibus, foliis angustioribus, acuti-

oribus, capitulis maioribus plurifloris, calycibus angustioribus et longioribus, corollis brevioribus, tubo angustiore et magis curvato.

Crescit in Tauro Armeno ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, ad rupes schistosas alt. ca. 1800 m. Legi 1. VIII. 1910 (No. 1476).

Z. dasyantha M. B. Taurus Armenus: Warak-Daṛ prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in rupestribus graniticis alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 1596).

Z. tenuior L. Arabia Petraea: El-Bêga inter pagos Šôbak et Elgi (Wâdi Mûsa, Petra) in steppa alt. ca. 800 m, 18. VI. 1909 (No. 1666); in steppis inter Elgi (Wadi Mûsa) et Ma'ân, alt. ca. 900 m. 20. VI. 1909 (No. 1654). Persia austro-occidentalis (Susiana): Cherr-eš-Šaucha inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), in glarea rivi. 23. III. 1910 (No. 1453). Kurdistania Turcica: ad pagum Matâra inter Hanikîn et Salahîje (Kifri), in steppa alt. ca. 200 m. 14. V. 1910 (No. 1545).

Z. Abd-el-Azizi Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti, Pteridoph. und Anthoph. aus Mesopotam...., p. 418.] Persia austro-occidentalis (Susiana): ad rivum Cherr-eš-Šaucha inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), in steppa. 22. III. 1910 (No. 1541); ad fluvium Čekâb eiusdem ditionis, in steppa ad terram nudam. 24. III. 1910 (No. 1618).

Z. capitata L. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad terram nudam alt. ca. -200 m. 30. III. 1909 (No. 1696). Kurdistania Persica: infra pagum Režâb dit. Қasr-i-Şirîn, in graminosis aridis alt. 800—900 m. 5. V. 1910 (No. 1586).

Salvia macrochlamys Boiss. et Ky. [Fig. 13, pag. 48.] *Specimina ca. 50 cm alta, folia caulina maxima ca. 8 cm longa et 5 cm lata (basalia iam emarginata), dentata vel crenato-dentata; calyx ca. 2 cm longus. Corollae ca. 3 cm longae tubus calycem aequans vel paullum superans, intus ad medium villis e tuberculis parvis atris orientibus villosus, labia extus hirta, superius roseum, inferius rubrum. Tota planta viscidula, aromatica.* Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Kotmos ad orientem ab oppido S'ert, in vineis alt. ca. 700 m. 15. VII. 1910 (No. 1610).

S. triloba L. fil. Palaestina, in declivitatibus saxosis occidentem spectantibus frequens. Ad pagum Abu Rôš alt. ca. 600 m, 2. IV. 1909 (No. 1690a), ad Bêt Ĝemal ca. 550 m. 6. IV. 1909 (No. 1690).

S. pinnata L. Judaea: ad pagum Dêr Abân dit. Hierosolymorum, in margine agrorum alt. ca. 500 m. 6. IV. 1909 (No. 1674).

S. bracteata Russ. [Fig. 13, pag. 48.] Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Handrian-Daṛ supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in humosis alt. ca. 1700 m. 23. V. 1910 (No. 1571).

S. trichocladia Bth. [Fig. 15, pag. 52.] *Calyx ca. 20 mm, corolla ca. 36 mm longa, carnea. Folia floralia violaceo-suffusa.* Kurdistania Turcica: ad pagum Režâb dit. Қasr-i-Şirîn, in humosis alt. ca. 1400 m. 5. V. 1910 (No. 1615).

S. acetabulosa Vahl. var. *simplicifolia* Boiss. [forma ad var. *Szovitsianam* (Bge.) Bornm. [Plantae Straussianae II, Beih. Bot. Centralbl. XXII₂, pag. 121] vergens, *axibus racemi solum infra verticillastra pubescentibus, ceterum glabris.*] *Palaestina orientalis* (Ammon): El-Belka, dit. 'Ammân (Rabbath Ammon), in agris alt. ca. 750 m. 17. IV. 1909 (No. 1699). *Kurdistania Persica*: *infra pagum Režâb* dit. Kasr-i-Širîn, in humosis alt. ca. 900 m—1200 m. 5. V. 1910 (No. 1501 et 1590). *Kurdistaniae Turcicae* distr. Berwari: mons Choarra-Sia supra pagum 'Ain




Fig. 13.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

- 1. *Salvia bracteata* Russ. 2. *Salvia albifrons* Nk. 3. *Salvia compressa* Vahl.
 - 4. *Salvia macrochlamys* Boiss. et Ky. 5. *Salvia brachycalyx* Boiss.
- (Flores et calyces ca. $\frac{1}{10}$.)

Nûne inter Amadia et Hašîtha, in graminosis aridis alt. ca. 1500 m. 16. VI. 1910 (No. 1592). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia legit Fr. Anastase Cadell. (No. 1484).

S. Pinardi Boiss. Arabia Petraea: in agris ad Eš-Šôbak. 21. VI. 1909 (No. 1702).

S. Syriaca L. Judaea: in agris dit. Hierosolymorum frequens. Ad pagum Bittîr, alt. ca. 700 m. 3. VI. 1909 (No. 1661). *Kurdistania Persica*: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in graminosis alt. ca. 900 m, 5. V. 1910 (No. 1614); ad Kasr-i-Širîn, inter segetes alt. ca. 400 m.

7. V. 1910 (No. 1546). *Kurdistania Turcica*: ad pagum Mâr Jakub dit S'ert, inter segetes alt. ca. 920 m. 12. VII. 1910 (No. 1456).

S. Syriaca L. var. *macrocalycina* Bornm. [Verhandlungen d. Zoolog.-botan. Ges. Wien 1898]. *Kurdistaniae Turcicae distr.* Šerizor: ad pagum Baba Čiġik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in graminosis alt. ca. 680 m. 20. V. 1910 (No. 1626).

S. compressa Vahl. [Fig. 13, pag. 48.] *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*), in steppis ad Deilerûn (Deh-i-Loran). 24. III. 1910 (No. 1619).

Salvia albifrons Nábělek sp. nova. [Tab. V; pag. 48, fig. 13.]
 Sect. *Aethiopis* Bth. § *Homalosphaeae* Boiss. *Biennis (aut perennis)*, e radice crassa, verticali, sublignosa, caulem unicum floriferum et forsan rosulas steriles, florendi tempore nondum evolutas, edens. *Caulis* crassus, rectus, ca. 45 cm altus, ad basin ca. 1 cm crassus, quadragulus, angulis obtusis, patule hirtellus et viscidus, basi violaceus, supra albidus, a foliorum pari secunda ramosus, ramis in angulo ca. 45° distantibus paniculam per pulchram pyramidalem formantibus. *Folia* radicalia longe petiolata, e basi cordata ovata, acuta, grosse lobata, irregulariter grosse dentata, rugulosa, pallide viridia, supra parcius subtus densius albido-hirtella, viscidula, nervis subtus prominulis percursa, 12—15 cm longa, 5—6 cm lata, pedunculis 5—7 cm longis, supra canaliculatis, suffulta. *Folia* caulinata brevius pedunculata et sensim diminuta, ceterum radicalibus similia, summa sessilia, basi late cordata caules amplectentia. *Folia floralia* e basi cordata, caules late amplectente et verticillastra involucrante, longe caudatim acuminata, acutissima, flores superantia, in margine integra, ciliata, parce hirtella, viscidula, hyalino-albida, tenuissima, 2—3 cm longa et 1—1.5 cm lata. *Verticillastra* 4—6-flora, inferiora remota, superiora magis approximata, bractearum caudis comosa. *Flores* mediocres, sessiles. *Calyx* membranacei, albidi, ca. 2 cm longi, tubus ca. 12 mm longus, longe et anguste tubuloso-campanulatus, praesertim ad nervos glanduloso-puberulus, viscidulus; dentes recti, lanceolati, acuminati, apice subulati, non pungentes; summus brevissimus. *Corolla* albae, ca. 28—30 cm longae, labium superius inferiori ca. aequilongum, modice curvatum, breviter bifidum, extus ad apicem parce puberulum; labii inferis profunde trilobi lobi exteriores angusti, linear-lanceolati, acuti, lobus intermedius rotundatus, retusus, integer.

Ex affinitate proxima *Salvia Reuteriana* Boiss. esse videtur, a qua praesertim bracteis multo longius caudatim acuminatis et calycibus angustioribus differt.

Crescit in *Persia austro-occidentalis* (*Susiana*): in steppis ad fluvium Kercha inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), ubi specimen unicum legi 22. III. 1910 (No. 1454).

S. Palaestina Bth. Moab: ad Rabba (Rabbath Moab), ad rupes calcar. alt. ca. 900 m. Forma *humilis*, caulis ca. 25 cm altis, radice crassa, lignosa, foliis basalibus parvis, cum petiolo 4—5 cm longis, pro-

funde pinnato-lobatis, albido-villosis, caulinis paucis (1—2 paribus) valde diminutis. 25. VI. 1909 (No. 1681). Persia austro-occidentalis (Susiana), in steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran). *Forma foliis floralibus calycibus brevioribus, roseo-violaceis, corolla caeruleo-violacea.* 22. et 24. III. 1910 (No. 1542 et 1617).

S. Palaestina Benth. var. **albo-lanata** (Boiss.) Nábělek [In scheda specim. Kotschyani ex Persia australi No. 890 in herbario Musei Palat. Vindobonensis inedit.] (Fig. 15, pag. 52.) *Folia rosulata tota (petiolus et lamina) longissime albo-lanata pilis rectis, tenuissimis, usque 10 mm longis, simplicibus, septis. Folia caulinata praeter pubem adpressam, cinereum, longiuscule villosa, inferiora petiolo usque 5 cm longo, laminam aequante, suffulta, profunde pinnato-lobata, lobis infimis remotis, superiora cito diminuta, summa sessilia, floralia calycibus breviora, praeter marginem viridem roseo-violacea. Calyxis dentes quam in typo brevius acuminati, spinula breviore terminati, violaceo-suffusi. Corolla calyce ca. duplo longior, ca. 30 mm longa, pallide caeruleo-violacea.*

Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis ad Deilerûn (Deh-i-Loran). 26. III. 1910 (No. 1455). Kurdistania Persica: in steppa ad Kasr-i-Širîn dit. Hanikîn, alt. ca. 400 m. 7. V. 1910 (No. 1584). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Baba Čišk inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 680 m, 20. V. 1910 (No. 1627); ad pagum Tell Kef (Tell-is-Kof) dit. Môşul, in agris alt. ca. 350 m. 6. VI. 1910 (No. 1510).

S. graveolens Vahl. Judaea: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, in lapidosis alt. ca. 300 m. 2. IV. 1909 (No. 1630). Moab: Wâdi ez-Zerka dit. Mâdaba, in saxosis aridis alt. ca. 350 m. 28. VI. 1909 (No. 1656).

S. microstegia Boiss. et Bal. (= S. verbascifolia M. B. var. cana Boiss.) Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Čezîret-ibn-Ômar, ad declivitates argilosas nudas aridissimas alt. ca. 1800 m, *forma densius et longius albo lanata.* 26. VII. 1910 (No. 1602) et in humosis alt. ca. 2300 m *forma viridior, praesertim ad caules minus dense lanata.* (No. 1460).

Salvia poculata Nk. sp. nova. [Fig. 14, pag. 51.] Sectio Aethiopis § 2. *Gongrosphacea* Boiss. *Perennis, e radice lignosa, fusca, caules floriferos et rosulas steriles edens. Folia rosularum sterilium ovata, basi rotundata, subcordata aut breviter attenuata, sublobata, denticulata, obtusa, rugosa, dense arachnoideo-floccosa, iuvenilia albida, tum canescentia, nervis subtus prominentibus, lamina ca. 13—15 cm longa et 5 cm lata, petiolis supra canaliculatis usque 10 cm longis suffulta. Caules floriferi inferne villosi, in partibus floralibus hirsuti, viscosi, mox in paniculam ramosam, patentem, abeuntes, 30—40 cm alti. Folia caulinata infima eis rosularum sterilium similia, superiora brevius petiolata, magis lobata, sursum cito diminuta, sessilia, basi rotundata aut*

subcordata caules amplectentia, in folia floralia sensim transeuntia. Folia floralia basi rotundata aut subcordata, caules amplectentia et rerticillastra involucrantia, quasi poculos formatia, ovato-orbiculata, breviter acuminata, acuta, hirsuta, viscida, ca 15 mm longa et aequilata, flores aequantia. Verticillastra 3—5-flora, remota, summa abortiva, floribus parris, breviter pedicellatis (pedicello ca. 3 mm longo). Calyx ca. 8—9 mm longi breviter campanulati, papilloso-hirti, viscidii labia subaequilonga, dentes triangulares, apice mucronati, superiorum intermedius lateralibus subbrevior. Corollae pallide rosae, e calyce labiis tantum ex-




Fig. 14.
Salvia poculata Nk. (ca. $\frac{2}{1}$.)

Del. Dr. Fr. Nábělek.

sertae, ca. 12 mm longae, tubus in faucem saccatam abrupte dilatatus, intus squamula penicillata minima instructus, labium superius modice curvatum, retusum, extus hirtellum, labium inferius planum trilobum, lobis laterilibus angustis, lanceolatis, acutis, intermedio rotundato, retuso, crenulato.

Ex affinitate *Salviae frigidae* Boiss. esse videtur, a qua differt praesertim foliis floralibus maioribus, acuminatis, acutis, flores aequantibus nec obtusis, calyces subaequantibus, corolla breviore, calycem labiis tantum superante nec eo duplo longiore.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Aradēn dit. Amadia, in agris alt. ca. 1000 m, legi 14. VI. 1910 (No. 1548), et in Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Handrian-Dar supra Rewandūz dit. Erbil (Arbela), in humosis alt. ca. 1700 m. 23. V. 1910 (No. 1570).

S. candidissima Vahl var. nova **cordifolia** m. [Tab. IV, fig. 3, pag. 52, fig. 15]. *Foliis late cordatis aut cordato-ovatis, maximis ca. 6 cm longis et latis aut 7 cm longis et 6 cm latis, crassiusculis.* Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter Aradê et Hašîtha, ad terram rossam nudam in declivitatibus aridissimis alt. ca 900 m. 21. VI. 1910 (No. 1527); districtus Ramorân: Halakur-Dar ad septentriones ab oppido Ğeziret-ibn-Ômar, ad terram nudam argilosam alt. ca. 1700 m. 26. VII. 1910 (No. 1469).

S. limbata C. A. Mey. *Forma foliis planis, minus rugosis, calyce et corollae labio superiore minus hirsuto. Calyx fructifer usque 13 mm*




Fig. 15.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Salvia trichoclada* Bth.
2. *Salvia candidissima* Vahl. var. **cordifolia** Nk.
3. *Salvia Palaestina* Bth. var. *albo-lanata* Nk.
4. *Salvia virgata* Ait. var. *densiflora* Nk.
(Fig. 1—3 ca. $\frac{1}{1}$, fig. 4 ca. $\frac{1.5}{1}$.)

longus. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, inter segetes alt. ca. 2000 m. 1. VIII. 1910 (No. 1477). Ad Topra Kaleh prope Wan, in agris alt. ca. 1900 m. (*Forma parviflora floribus vix 15 mm longis*). 17. VIII. 1910 (No. 1554).

S. brachycalyx Boiss. [Fig. 13, pag. 48]. Kurdistâniae Turcicae distr. Šerizor: Traiectus Serderian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in rupestribus umbrosis alt. ca. 1500 m. 22. V. 1910 (No. 1574).

S. Hierosolymitana Boiss. Judaea: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 650 m. 25. III. 1909 (No. 1684).

S. virgata Ait. var. nova **densiflora** Nk. [Fig. 15, pag. 52.] *Folia valde rugosa, sublobata, crenata, ovato-oblonga, basi subcordata, supra pallide viridia, subtus canescens. Caulis simplex, racemus simplex aut ramulis inferne duobus abbreviatis auctus, verticillastra approximata,*

racemosus ideo densiflorus et crassus nec virgato-ramosus, verticillastris distantibus longe racemosus. Corolla pallide caeruleo-violacea, ca. 15 mm longa, calyx ca. 8 mm longus.

Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Bestabije prope pagum Hoz inter Hašitha et Šattak, in humosis alt. ca. 1600 m. 30. VII. 1910 (No. 1604).

S. nemorosa L. var. *pseudo-sylvestris* (Stapf) Bornm. [Plantae Straussianaæ, Beih. botan. Centralbl. XX/2, pag. 123]. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, inter segetes alt. ca. 2000 m. 31. VII. 1910 (No. 1478).

S. verbenaca L. Judaea: Wâdi el-Ğôz prope Hierosolyma, inter rupes alt. ca. 700 m. 24. III. 1909 (No. 1649). Moab: in steppa ad Rabba (Rabbath Moab), alt. ca. 900 m. 25. VI. 1909 (No. 1680).

S. lanigera Poir. (= *S. controversa* Boiss.) Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Hamrîn inter Barđâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 180 m. 2. V. 1910 (No. 1457).

S. viridis L. Moab: Wâdi Kerak inter El-Kerak et Mare Mortuum, in steppa alt. ca. 200 m. 15. VI. 1909 (No. 1633).

S. Horminum L. Judaea: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, in agris alt. ca. 300 m. 3. IV. 1909 (No. 1632).

S. Aegyptiaca L. Moab: Wâdi Kerak inter oppidum El-Kerak et Mare Mortuum, in saxosis alt. ca. 200 m. 15. VI. 1909 (No. 1634). Persia australis: Kuh Chormûğ dit. Bušîr (Abu Šehr), in rupestribus. 18. II. 1910 (No. 1535).

S. Bornmülleri Hausskn. [Mitt. Bot. Ver. Jena IX. (1891) p. 21.] Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter Aradêن et Hašitha, inter segetes alt. ca. 1200 m.

S. verticillata L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Bestabije prope pagum Hoz inter Hašitha et Šattak, in graminosis alt. ca. 1600 m. 27. VII. 1910 (No. 1558).

S. Amasia Freyn et Bornm. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Hašitha dit. Ğulamerik, in humosis alt. ca. 1500 m. 19. VI. 1910 (No. 1492).

S. Russelii Bth. Armenia Turcica: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in humosis alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 1598).

Nepeta iodantha¹ Nábělek sp. nova. [Tab. VI, fig. 1, pag. 54, fig. 16.] Grex. *Longiflorae* Boiss. *Perennis, radice lignosa, pluricipite. Caules e basi breviter procumbente erecti, quadranguli, angulis acutis sed non prominentibus, breviter, subtus densius, sursum parcius crispule-puberuli, basi tantum foliosi, ceterum solum 1—2 paria foliorum diminutorum gerentes, simplices, sursum amethystino-suffusi, 30—40 cm alti.*

¹ λώδης = violaceus.

Folia basalia parva, ca. 1·5 cm longa et 2 cm lata, petiolis usque 2 cm longis suffulta, late cordata, cordato-ovata aut suborbiculata, obtusa, grosse et regulariter lobato-crenata, crenis in utroque latere 4—6, terminali ceteris maiore, crassiuscula, in utraque pagina dense cinereo-tomentosa. Folia caulinia diminuta, pedunculis sursum abbreviatis, superiora sessilia, cordato-ovata usque oblonga, floralia minima, oblongo-lanceolata. Cymae 3—5-florae, infimae longius, ceterae breviter pedunculatae aut subsessiles, pedunculis firmis infimis ca. 1·5 cm longis, paniculam contractam, valde interruptam, formantes. Bracteae minimae, 2—3 mm




Fig. 16.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Nepeta purpurea* Nk. (ca. $1\frac{5}{1}$). 2. *Nepeta iodantha* Nk. (Flos ca. $1\frac{5}{1}$, folium ca. $1\frac{1}{1}$).
3. *Nepeta Mussini* Henk. var. *albiflora* Nk. (ca. $1\frac{5}{1}$). 4. *Nepeta teucriifolia* Willd. (ca. $2\frac{1}{1}$).
5. *Nepeta leucostegia* Boiss. (ca. $2\frac{1}{1}$). 6. *Nepeta glabrescens* Boiss. (ca. $1\frac{5}{1}$).

longae, subulatae, violaceae, hirsutae. Calyces ca. 8 mm longi, dense et patentim strigulos-hirsuti et glandulosi, tubo leviter incurvo, striato, cinerascente, striis violaceis, ore valde obliquo, dentibus valde inaequalibus, latiusculis, brevissime acuminatis, acutis, amethystinis, nervis tribus percursi, medio recto, dentis apicem attingente, lateralibus sub apice extremitate sua arcuatim incurvis. Corollae ca. 20 mm longae, violaceo-caeruleae, breviter hirtellae, tubus tenuis, incurvus, calyce subduplo longior, in faucem subabrupte dilatatus, labium superius profunde bifidum, lobis obtusis, labii inferioris lobus intermedius orbiculatus, concavus, crenatus, basi

pilosus, lobi laterales breves, obtusi. Nuculae leves, ca. 3 mm longae et 1 mm latae, brunneae.

Ex affinitate *Nepeta* *Teucriifoliae* Willd. esse videtur, a qua differt praesertim indumento multo densiore, paniculis contractis, cymarum pedunculis firmis, calycibus longioribus et latioribus. A *Nepeta macrosiphone* Boiss. anguste paniculata, differt pedunculis erectis, superioribus basi subadpressis nec divaricatis, foliis minoribus, caulis parte aphylla multo longiore, floribus minoribus.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentriones ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, ad rupes calcar. aridas alt. ca. 2300 m. Legi 25. VII. 1910 (No. 1468).

N. teucriifolia Willd. [Fig. 16, pag. 54]. *Corolla caeruleo-violacea, ca. 12 mm longa, calyx amethystinus, ca. 7 mm longus, nuculae linearis-oblongae, trigonae, minutissime punctulatae, brunneae, ca. 2 mm longae et 1 mm latae.* Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Bestabîje prope pagum Hoz inter Šattak et Hašîtha, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1600 m. 30. VII. 1910 (No. 1490 et 1607).

N. leucostegia Boiss. [Fig. 16, pag. 54]. *Calyx ca. 5 mm longus, bractae eum subaequantes, corolla ca. 9 mm longa.* Arabia Petraea: Wâdi Buseira dit. Šôbak, ad rupes calcar. aridas alt. ca. 550 m. 17. VI. 1909 (No. 1667).

N. Orientalis Mill. *Calycis ca. 8—9 mm longi dentes 3—4 mm longi, bractae calyce breviores (ca. 6 mm longae), corolla 11—12 mm longa, nuculae oblongae, apice rotundatae, basi breviter attenuatae, atrae, ca. 2 mm longae.* Tota planta odore gravissimo, camphorato, praedita. Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, ad rupes calcar. alt. ca. 900 m. 16. VI. 1910 (No. 1502).

Nepeta purpurea Nábělek species nova. [Tab. VII, fig. 4, pag. 54, fig. 16]. Grex *Stenostegiae* Boiss. *Perennis, e radice lignosa pluriceps. Caules recti, quadrangulares, angulis prominentibus, albidis, simplices aut inferne tantum ramulis tenuibus, brevibus, aucti, inferne breviter et parce hirtuli, superne glabri, foliosi, 30—35 cm alti. Folia inferiora petiolata, cordato-ovata, grosse dentato-serrata, acutiuscula, pagina superiore parce, inferiore paullo densius breviter hirtella, viridia, maxima ca. 3 cm longa et 2 cm lata, nervis subtus prominulis. Folia superiora subsessilia, e basi cordata longe acuminata, dentibus basalibus elongatis, linearis-lanceolatis, caules amplectentia, ca. 3 cm longa et basi dentibus exceptis ca. 1 cm lata, dentibus basalibus ca. 5 mm longis. Folia floralia inferiora oblongo-lanceolata, basi rotundata sessilia et caules semiamplectentia, dentibus obsoletis subintegra, flores superantia, superiora cito diminuta oblongo-lanceolata usque linearis-lanceolata. Bracteae linearis-lanceolatae, apice subulatae et purpureo-coloratae, dense albido-hirsutae, ca. 4—5 mm longae, calycis tubum dimidium aequantes. Verticillastrum*

cymis breviter pedicellatis, 8—12-floris formata, in capitula terminalia orata congesta, infimis solum interdum paullum remotis. Calycis brevisime pedicellati, dense albido-hirsuti, glandulosi, recti, striati, ore vix obliquo, tubo 8—9 mm longo, dentibus 5—6 mm longis, subaequalibus, e basi latiore longe acuminatis, apice subulatis, purpurascensibus. Corolla purpureae dense et breviter albido-hirsutae ca. 24 mm longae tubus longe exsertus, labium superius bifidum, cucullatum, atratum, extus albo-villosum, labii inferioris lobus intermedius orbiculatus, crenatus, concavus, basi pilosus, atro-purpureus, ca. 5 mm diametro tenens. Antherae atrobrunneae, minime exsertae. Nuculae ignotae.

Ex affinitate *Nepeta aristata* Boiss. et Ky. esse videtur, a qua differt caulibus brevioribus et simplicibus, foliis hirtellis nec glabris, calycibus et corollis dense albido-hirsutis, longioribus, verticillastris in capitula terminalia congestis.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Mons Dwile supra pagum Hašītha dit. Čulamerik, in humosis alt. ca. 2100 m. Legi 18. VI. 1910 (No. 1496).

N. glabrescens Boiss. [Fig. 16, pag. 54.] *Calycis ca. 8 mm longi os et dentes, bractae et caulin pars summa amethystina, corolla ca. 15 mm longa, caerulea.* Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Siares supra pagum Hašītha dit. Čulamerik, in humosis alt. ca. 1800 m. 19. VI. 1910 (No. 1496).

N. Mussini Henk. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Kēla Mame supra pagum Hoz inter Hašītha et Šattak, ad rupes calcar. nigras alt. ca. 2700 m. 28. VII. 1910 (No. 1518). Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočānes, in agris alt. ca. 2150 m. 1. IX. 1910 (No. 1473).

N. Mussini Henk. var. *nova albiflora* Nk. [Tab. VII. fig. 1; fig. 16, pag. 54.] *Difert a typo in dumento parciore, ad formas umbrosas minutissimo, foliis latioribus et profundius cordatis, ca. 2 cm longis et latis (ad formas umbrosas usque 3 cm longis et aequilatis), minus crebre et grossius crenatis; longius pedunculatis, pedunculis ca. 2 cm (usque 3 cm) longis, cymis paucioribus, inferioribus remotis, superioribus in capitulum confluentibus, saepe capitula terminalia, solitaria, formantibus; bracteis lanceolatis, praeter nervum centralem fere hyalinis, longe acuminatis, in aristam hyalinam productis, longiusculi et dense ciliatis, ca. 4 mm longis; calycibus minus dense et minus molliter tomentosis, longioribus et angustioribus, ca. 7 mm longis (calyces typi ca. 6 mm longi), dentibus hyalinis aut caeruleo-suffusis; corolla alba, longiore, ca. 15 mm longa (typi ca. 12 mm longa), tubo tenuiore, longius exerto. Ceterum corolla cum ea typi conformis.*

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Čelo-Dar dit. Čulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, in fissuris rupium calcar. nigri alt. ca. 2990 m. Legi 3. IX. 1910 (No. 1489 et 1489a, forma umbrosa).

N. curviflora Boiss. Palaestina: mons Karmel, ad el-Muchraka, in saxosis alt. ca. 520 m. 2. V. 1909 (No. 1650); Judaea: ad Hebron, inter rupes alt. ca. 900 m. 27. V. 1900 (No. 1664).

N. Pannonica L. [= *N. nuda* L. var. *albiflora* Boiss.] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Siares supra pagum Hašītha, in humosis alt. ca. 1700 m. 19. VI. 1910 (No. 1613).

N. Kurdica Hausskn. et Bornm. [Bornmüller: Zwölf neue Netearten, Bull. Herb. Boiss. VII., pag. 251.] Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: in steppa ad colles aridos prope pagum Dēr Harīr inter Erbil (Arbelā) et Rewandūz, alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 1624).

Lallemandia Iberica (M. B.) F. et M. Kurdistania Persica: supra pagum Režāb dit. Kasr-i-Širin, in graminosis alt. ca. 1200 m. 5. V. 1910 (No. 1587). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Rewandūz dit. Erbil (Arbelā), in graminosis alt. ca. 900 m. 23. V. 1910 (No. 1569).

Tapeinanthus Persicus Boiss. (= *Thuspeiantha Persica* Briq.) det. Bornmüller [Fig. 18, pag. 60.] Moab: Wādi Mōğib (Arnon), ad terram nudam aridissimam alt. ca. 400 m. 17. VI. 1909 (No. 1704). Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ān. 21. VI. 1909 (No. 1682). [In Arabia nondum repertus].

Scutellaria Orientalis L. var. *alpina* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Kēla Mame supra pagum Hoz inter Hašītha et Šattak, ad nives tabescentes alt. ca. 2750 m. 28. VII. 1910 (No. 2006).

S. tauricola Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti: Pteridophyta u. Anthoph. aus Mesopotam. p. 409.] Forma *caulibus et foliis parcissime pilosis et glandulosis, in partibus floralibus tantum copiosius vestitis.* Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Bēdu inter Aradēn et Hašītha, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1000 m. 21. VI. 1910 (No. 2036); in valle Châne prope pagum Bēdu dit. Hašītha, ad terram rossam inter rupes alt. ca. 1200 m. 21. VI. 1910 (No. 1495).

S. pectinata Montb. et Auch. Forma *indumento tenuiore et breviore, bracteis angustioribus, foliis breviter petiolatis, laminae laciniis minimis, margine revolutis.* Armenia Turcica: ad oppidum Malatia legit. Fr. Anastase Cadell (No. 1931).

S. fruticosa Desf. Judaea: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, inter rupes calcar. aridas alt. ca. 400 m. 18. V. 1909 (No. 1672). Arabia Petraea: El-Hôr prope Wādi Mûsa (Petra), in lapidosis alt. ca. 900 m. 18. VI. 1909 (No. 1639).

S. multicaulis Boiss. var. *nepetifolia* Bornm. [Bornmüller: Plantae Straussiana, Beih. Botan. Centralbl. XX/2, pag. 129]. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in rupestribus alt. ca. 1900 m. 31. VII. et 1. VIII. 1910 (No. 1447, 1007 et 1609).

S. peregrina L. var. *Sibthorpii* Boiss. Judaea: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, in rupestribus alt. ca. 400 m. 18. V. 1909 (No. 1689);

Ain Čidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -200 m. 26. V. 1909 (No. 1663); ad Hebron, alt. ca. 900 m. 26. V. 1909 (No. 1635). Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Bengof ad orientem ab oppido S'ert, inter rupes alt. ca. 900 m. 20. VII. 1910 (No. 1464).

S. albida L. var. *purpurascens* Bornm. [Plantae Straussianae l. c. pag. 129] Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Aradêr dit. Amadia, in quercetis alt. ca. 1200 m. 16. VI. 1910 (No. 1513); ad pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašîtha, in quercetis alt. ca. 1350 m. 16. VI. 1910 (No. 1526).

Brunella vulgaris L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiali: ad pagum Hašîtha dit. Čulamerik, in pratis humidis alt. ca. 1650 m. 18. VI. 1910 (No. 1547). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, ad fontes et rivulos alt. ca. 1800 m. 31. VII. 1910 (No. 1560); Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in pratis humidis alt. ca. 2200 m. 23. VII. 1910 (No. 1595).

Marrubium Kotschy Boiss. et Hoh. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: inter pagos Aradêr et 'Ain Nûne dit. Amadia, in rupestribus ad fontem alt. ca. 950 m. 15. VI. 1910 (No. 1523); mons Rêša d'Amadia prope Amadia, inter frutices quercuum alt. ca. 1700 m. 22. VI. 1910 (No. 1533).

Marrubium cordatum Nábělek sp. nova. [Fig. 17, pag. 59.] Sect. *Eumarrubium* Bth. *Basi suffruticosum, ramosum, caulis sterilibus abbreviatis, fertilibus, ca. 20—35 cm altis, e basi procumbente erectis, acute quadrangulis, longe et molliter patentim albo-villosis, villis usque 3 mm longis, caulum diametrum ca. duplo superantibus, inferne densioribus. Foliis ramorum sterilium et caulum floriferorum inferioribus longe petiolatis, petiolis laminas plus duplo usque 2 ½ superantibus, ca. 3 cm longis, longe albido-lanatis, supra canaliculatis, superioribus minus longe petiolatis, petiolis ca. 2 cm longis, floralibus infimis petiolis ca. 0·5 cm longis suffultis, lamina foliorum caulinorum rotundata aut subreniformi, basi profunde cordata, ca 1·25 cm longa et 2—2·5 cm lata, in utraque pagina molliter hirsuta viridi, concolori, rugulosa, nervis supra canaliculatis, subtus prominulis, in margine inaequaliter crenata, sinu ca. 5 mm profundo.* *Folia floralia infima obovata, in petiolum breviter cuneatim attenuata, ca. 2 cm longa et 1·5 cm lata, prorsus serrato-crenata, longe sericeo-lanata, verticilos longe superantia, suprema diminuta, obovato-cuneata, ca. 10 mm longa et 6 mm lata, verticillastris breviora aut ea aequantia. Verticillastra multiflora, inferiora remota, superiora approximata. Bracteae subulatae, in mucronem subpungentem exentes, longe albido-plumosae, calyces aequantes aut paullo superantes, ca. 8 mm longae. Calyx superne longe plumoso-villosus, inferne parcius et brevius hirtellus, et praeterea brevissime sed sat dense glandulosus, pube stellata omnino carens. Calycis tubus ca. 6 mm longus, albidus, nervis prominentibus viridibus percursus, intus glaberrimus, dentes e basi triangulari subu-*

lati, longe plumoso-hirsuti, in mucronem subpungentem producti, recti aut paullum extus curvati, ca. 2 mm longi, inferiores sublongiores. Corolla rosea ca. 12 mm longa, extus pube stellata, adpressa, densa, et praeterea pilis simplicibus, parcis, vestita. Corollae tubus subexsertus ca. 7 mm longus, ad medium constrictus (ubi intus pilorum annulus et staminum insertio), limbi maiusculi labium superum profunde bifidum tubo subaequilongum, labii inferioris lobi laterales anguste linear-lanceolati, intermedius suborbiculatus, subretusus, obsolete crenulatus, latior quam longus (ca. 4×5 mm), planus aut convexus.




Fig. 17.

Del. Dr. Fr. Nábělek

Marrubium cordatum Nk. Flos ca. $\frac{2}{3}$, folia ca. $\frac{1}{2}$.

Ex affinitate *Marrubii purpurei* Bunge, a quo differre videtur indumento non adpressiusculo sed patenti, verticillastris supremis non vel vix confluentibus, bracteis calycem aequantibus nec calycis tubo brevioribus, calycis dentibus ca. triplo nec quadruplo brevioribus, corollae roseae nec violaceae limbo maiusculo.

Specimina Straussiana e Kurdistania, prope Burudscheid, prope Nehawend et Douletabad, a cl. Bornmüller *Marrubium purpureum* Bge var. *Kurdicum* Bornm. [Plantae Straussianae, Beih. Botan. Centralbl. XXII./2, pag. 130] determinata, forsitan cum speciminibus meis congruentia, sed ex descriptione varietatis l. c. huius folia nunquam reniformia. Si tamen specim. mea et specim. Straussiana congruerint, species ***Marrubium Kurdicum*** (Bornm. pro var.) Nábělek nominanda.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar. ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2300 m. Legi 25. VII. 1910 (No. 1517 et 1601).

M. vulgare L. Judaea: ad pagum Latrûm dit. Hierosolymorum, in lapidosis alt. ca. 300 m. 2. IV. 1909 (No. 1694).

M. vulgare L. var. *nova gossypinum* m. [Tab. III, fig. 1.]
Totum, ad caules et ad folia utraque facie, indumento gossypino, crasso, bombycino argenteum. Folia parva, ovato-orbiculata, basi truncata, in petiolum brevem breviter attenuata, ca. 1 cm diametro tenentia. Calyces dense stellato-tomentelli, glandulosi, et praeterea pilis simplicibus hirsuti, fructiferi dentibus exceptis usque 6 mm longi.




Fig. 18.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Marrubium parviflorum* Fisch. et Mey. (ca. $\frac{6}{1}$). 2. *Marrubium cuneatum* Russ. var. *spinulosum* Boiss. (ca. $\frac{6}{1}$). 3. *Tapeinanthus Persicus* Boiss. (ca. $\frac{3}{1}$).

Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in lapidosis aridissimis alt. ca. 750 m. 18. VII. 1909 (No. 1671); Wâdi el-Kelt prope Jericho, in aridissimis alt. ca. 200 m. 30. III. 1909 (No. 1697).

M. cuneatum Russ. var. *spinulosum* Boiss. [Fig. 18, pag. 60.]
 Kurdistania Turcica (Assyria): in stepis inter Altunköpri et Erbil (Arbela), alt. ca. 300 m. 17. V. 1910 (No. 1544).

M. parviflorum Fisch. et Mey. [Fig. 18, pag. 60.] Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in humosis alt ca. 1900 m. 1. VIII. 1910 (No. 1556).

Sideritis montana L. Taurus Armenus: ad pagum Chôšab dit. Wan, in agris alt. ca. 1900 m. 7. IX. 1910 (No. 1461).

S. Libanotica Labill. Kurdistaniae Turciae distr. Hakkiari: mons Bestabije prope pagum Hoz inter Hašitha et Šattak, in graminosis alt. ca. 1600 m. 30 VII. 1910 (No. 1605).

S. Libanotica Labill. var. *incana* Boiss. Kurdistania Turcica

(Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1100 m. 9. VI. 1910 (No. 1514).

S. pullulans Vent. Moab: mons Nebo dit. Mâdaba, in steppa alt. ca. 800 m. 31. VI. 1909 (No. 1640).

Stachys Cretica Sibth. et Sm. Judaea: ad pagum Bittîr dit. Hierosolymorum, in lapidosis alt. ca. 700 m. 3. VI. 1909 (No. 1660).

S. Germanica L. var. *nova procera* Nk. *Elata, caulis plus 1 m altis, superne ramosis, breviter retrorsum-hirsutis. Folia in pagina superiore viridia, brevissime velutina, subtus albida, indumento densiore breviter velutina, parum rugulosa, crenulata, omnia, floralibus exceptis, pedunculata, basi cordata, inferiora oblongo-ovata, usque 10 cm longa et fere 5 cm lata, pedunculo 2—3 cm longo suffulta, superiora sensim diminuta, ovata, pedunculo abbreviato, floralia ovato-triangulata, longiuscule acuminata, acuta, basi rotundata, sessilia, verticillastra superantia, ca. 2 cm longa et 12 mm lata, utrimque sed subtus densius subsericeo-hirsuta. Verticillastra inferiora remota, superiora approximata et confluentia.*

Specim. mea cum specim. Kotschyanis: Plantae Pers. bor. No. 412 „in humidis faucis Schir Derra prope Derbent“ et Iter Cil.-kurd. No. 345 „in fauibus humidoribus pagi Goschkar“, a cl. Boissier visis sed in Fl. Or. non citatis, „*Stachys Germanica* var.“ determinatis, congruentia.

Legi in Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân ad pagum Bengof, ad orientem ab oppido S'ert, inter frutices salicum ad rivulum alt. ca. 800 mm, 20. VII. 1910 (No. 1467).

Stachys glechomaefolia Nábělek sp. nova. [Tab. VII, fig. 2, pag. 63, fig. 19.] Sect. *Stachyotypus* Boiss. *grex Fragiles* Boiss. *Radix lignosâ, in fissuras rupium descendens, fusca, multiceps, caules firmiores floriferos et paucos tenuissimos et breviores steriles edens. Caules floriferi fragilimi, basi indurati, tenues, e rupibus pendentes, patentim et molliter pilis usque 1 mm longis, eglandulosis et glanduliferis paucioribus intermixtis, villosuli, plerumque simplices aut basi parce ramosi, foliorum paria 2—3 gerentes, ca. 10 cm longi. Caules steriles pauci, tenuissimi, fere filiformes, vix 5 cm longi. Folia caulium floriferorum e basi cordata late ovata aut hemicyclica, obtusissima, aut inferiora etiam subretusa, grosse crenata, crenis utrimque 3—5, in utraque facie mollissime et dense villosa, subsericea, maxima ca. 2 cm longa et paullum latiora, pedunculo ca. 5 mm longo suffulta, summa subsessilia, floralia infima caulinis similia, sed sessilia et diminuta, calyces aequantia aut paullo superantia, summa basi abrupte cuneata, crenis in utraque parte 1—2, acutiusculis usque acutis, calyces subaequantia. Folia caulium sterilium parva, suborbiculata, basi cordata, obsolete crenata, crenis utrimque 1—3, obsoletis, aut subintegra longiuscule petiola, 9—5 mm diametro tenentia. Verticillastra 2—4-flora, infima subremota; cetera 3—4 approximata. Bracteae anguste oblongo-lanceolatae, breviter acuminatae, acutae, basi longe attenuatae, molliter*

hirsutae et glandulosae, glandulis longe stipitatis, ca. 6—7 mm longae, calycis tubum aequantes. Calyces pedicellis ca. 3 mm longis suffulti quinquenervii, nervis interst. vix visilibus, floriferi tubulosi, tum subcampanulati subbilabiati, pilis patentibus inaequilongis eglandulosis et glanduliferis hirsuti. Calycis tubus intus glaber, ca. 5 mm longus, os subobliquum, dentes triangulari-lanceolati, acuti, mutici, extus et intus dense hirsuti et glandulosi, superiores tres paullum connientes ca. 2 mm longi, inferiores profundius fissi, sublongiores. Corolla e ca. 2 cm longae, flavae, tubus exsertus calyce ca. duplo longior, 12 mm longus, ad medium intus annulo piloso instructus, infra annulum glaber, extra cum extus breviter hirtellus et glandulosus. Labium superum extus longiuscule hirsutum, cucullatum, truncatum, ca. 3 mm longum, labii inferi porrecti lobi laterales rotundati, subretusi, lobus centralis retusus, crenulatus, ca. 6 mm latus et 3 mm longus. Stamina sub labio supero occulta. Nuculae nondum maturissimae atro-brunneae, obovatae, trigonae, lateraliter carinato-subulatae, punctulatae, ca. 2.5 mm longae et 1.5 mm latae.

Ex affinitate proxima *Stachydis fragillimae* Bornm. [Bornmüller: Drei neue Arten aus dem östlichen Assyrien, Bull. Herb. Boiss. VII (1899), pag. 118], quae differt „calycis dentibus tubum aequantibus et demum eo (fructifero) longioribus, corolla albida in labio inferiore tantum purpurascenti-maculata“, acheniis obcordatis.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Choarra-Sia prope pagum Hašītha dit. Čulamerik, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1500 m. Legi 16. VI. 1910 (No. 1551).

Stachys graveolens Nábělek sp. nova. [Tab. VII, fig. 3, pag. 63, fig. 19.] Sect. *Stachydotypus* Boiss., grex *Fragiles* Boiss. *Radix lignosa, in fisuras rupium descendens, multiceps, caules floriferos numerosos, steriles nullos edens. Caules infima basi tantum indurati, ceterum herbacei, elongati, 20—40 cm longi, e rupibus dependentes, alteri simplices, tenuiores, verticillo florum unico, terminali, paucifloro, aut secundo inferiore 1—2-floro accedente, terminati, alteri crassiores, supra divaricatim ramosi, verticillastra complura, approximata, pluriflora gerentes, dense albido-tomentosi et praeterea pilis patentibus eis aequilongis, longissimis usque 2 mm longis, eglandulosis et glanduliferis, crebris, hirsuti et glutinosi (tomento ad plantas umbrosas teuniore et interdum subnullo). Folia inferiora breviter petiolata (petiolis usque 5 mm longis), superiora subsessilia, e basi cordata ovata, acuta, grosse serrata, in utraque facie molliter hirsuta, viridia, concolora, non sericea, pilis glanduliferis inter eglandulosos parcissimis intermixtis, nervis supra vix visilibus, subtus prominentibus, maxima ca. 3.5 cm longa et 3 cm lata, floralia inferiora basi truncata, summa abrupte cuneata, ca. 6 mm longa et 4 mm lata, calyces aequantia aut fere aequantia. Bracteae linearis-lanceolatae, plumosohirsutae et glandulosae, calycis tubum subaequantes. Calyces brevissime pedicellati, tubo manifeste 10-nervio, nervis sub anthesi minus manifestis,*




Fig. 19.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Stachys glechomaefolia* Nk.
2. *Stachys graveolens* Nk.
3. *Stachys graveolens* f. *congesta*. Flores et calyces ca. $\frac{3}{4}$, folia ca. $\frac{1}{1}$.

tum prominentibus, extus patentim hirsuto et glanduloso, intus glabro, ca. 5 mm longo, dentibus aequalibus, triangulari-lanceolatis, acutis, muticis, extus et intus hirsutis et glandulosis, ca. 2 mm longis. Corollae flavae ca. 15 mm longae tubus calyce subduplo longior, ca. 10 mm longus, ad annulum a basi ca. 5 mm elongatum subinfractus, infra annulum glaber, supra eum breviter hirtellus et glandulosus. Labium superum violaceo-suffusum, retusum, inferum porrectum, lobo medio suborbiculato, latiore quam longiore (5×3 mm), subintegro. Stamina subexserta. Nuculae obovatae trigonae, atrae, minutissime punctulatae, ca. 2 mm longae et 1·25 mm latae.

Specimina altera, e statione aridissima, abbreviata, caulis 10–20 cm longis, firmioribus, magis tomentosis et hirsutis, foliis minoribus, maximis ca. 15 mm longis et ca. 12 mm latis, indumento densiore vestitis, floribus subminoribus (ca. 13 mm longis), tota planta fere eglandulosa, formam aut vix varietatem congestam praebent. [Tab. III. fig. 5.]

Tota planta odore gravi odori *Lamii* simili graveolens.

Ex affinitate *Stachydis fragillimae* Bornm. et *Stachydis glechomae* foliae praecedentis esse videtur. A prima praeter ceteras notas differt calycis dentium proportione et corollae colore, a posteriore foliis serratis, nec crenatis, brevius petiolatis, calyce manifeste 10-nervio, corolla breviore, nuculis non lateraliter carinatis, odore.

A *Stachyde Pinardi* Boiss. differt. foliis breviter petiolatis (nec longe petiolatis), bracteis linear-lanceolatis (nec nullis), corolla flava (nec alba). *Stachys longiflora* Boiss. et Bál. differt foliis petiolis eis aequilongis suffultis, verticillastris 2-floris, calycis dentibus longioribus, spinulosis, corolla purpurascenti calycem ter superante.

Crescit in Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel ad septentr. ab oppido Môsul, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 900 m. Legi 27. VI. 1910 (No. 1507). Ad urbem S'ert, in rupibus calcar. in fauce fluv. Bochtan, alt. ca. 800 m. 12. VII. 1910 (No. 1581). Ad pagum Chaudûk inter Hassan Kef (Hisn Keifa) et S'ert, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 500 m, forma congesta. 12. VII. 1910 (No. 1580).

S. Iberica M. B. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Siares prope pagum Hašitha dit. Ğulamerik, in graminosis alt. 1600–1800 m. 19. VI. 1910 (No. 1497 et 1582).

S. Benthamiana Boiss. Forma fere eglandulosa, verticillastris distantibus. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Hašitha dit Ğulamerik, in lapidosis alt. ca. 1300 m. 17. VI. 1910 (No. 1591).

S. Benthamiana Boiss. var. clinopodioides Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Traiectus Serderian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1400 m. 24. V. 1910 (No. 1573).

S. Benthamiana Boiss. var. *cuneata* Bornm. [Plantae Strausianae, Beih. Bot. Centralbl. XXII/2 pag. 132.] *Kurdistania Persica*: ad pagum Režáb dit. Kasr-i-Širín, inter rupes calcar. alt. ca. 1200 m. 5. V. 1910 (No. 1587).

Stachys odoratissima Nábělek sp. nova. [Tab. III, fig. 2, pag. 65, fig. 20.] Sectio *Stachydotypus* Boiss. grex *Fruticosae* Boiss. ad interim. *Suffruticosa*, e radice crassa, lignosa, apice ca. 2·5 cm diametro tenente, cortice fusca obtecta, in fissuras rupium descendente, caules multos floriferos crassiores et steriles tenuiores edens. Caules basi indurati, cortice tenui flavo-fusca obtecti, recti, duri, simplices aut infra ramulis abbreviatis, sterilibus, aucti, acute quadranguli, in parte herbacea breviter retrorsum hirtuli, ca. 10 cm alti, in toto foliosi. Folia caulina caulium floriferorum oblonga, obtusissima, in petiolum brevem attenuata, integra, in utraque pagina dense brevissime cinereo-hirtella et




Fig. 20.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Stachys odoratissima Nk. Caulis et calyx ca. $\frac{1}{1}$, nucula ca. $\frac{1\cdot5}{1}$.

Phlomis orientalis Mill. var. *cordifolia* Nk.

praeterea crebre glanduloso-punctata, infima latiora et breviora, petiolo longiore suffulta (ca. 1 cm longa, 0·5 cm lata, petiolus 3—4 mm longus), superiora longiora et angustiora, brevius petiolata (ca. 2 cm longa et 3 mm lata), inferiora in axillis ramulos steriles, abbreviatos, superiora foliorum fasciculos gerentia. Folia caulium sterilium et fascicularium axilliariorum lineari-oblonga, obtusa, basi in petiolum brevissimum attenuata aut sessilia, 1·5—1 cm longa et 2—3 mm lata. Folia floralia ceteris breviora, oblongo-lanceolata, basi attenuata, sessilia, acuta, breviter mucronata, in marginibus 1—2 setas tenues, flavidas, usque 8 mm longas gerentia, calyces aequantia, ca. 1·5 cm longa et 2—3 mm lata. Bracteae parvae, lanceolatae, basi attenuatae, acutae, seta eis interdum aequilonga aut breviore terminatae, in margine setas 1—2 terminali similes gerentes, 3—4 mm longae. Flores in axillis foliorum superiorum solitarii, pauci (2—4), pedicello 2 mm longo suffulti. Corolla ignota. Calycis bilabiati ca. 14 mm longi tubus rectus aut haud subincurvus, ca. 6 mm longus, patule breviter hirtellus et crebre

glanduloso-punctatus, prominule 15-nervius, intus brevissime hirtellus sed non annulatus. Dentes parce hirtelli, crebre glanduloso-punctati, ciliatuli, trinervii, nervo medio in mucronem exeunte, tres superiores late triangulare-ovati, ca. 2 mm longi, mucrone ca. 1.5 mm longo terminati, duo inferi lanceolati, acuminati, ca. 6 mm longi, mucrone fere 2 mm longo terminati. Nuculae flavae, glaberrimae, leves, linearis-oblongae, subtrigonae, dorso subtrinerviae, ventre subcarinatae, basi attenuatae. apice obtusae et quasi coronula callosa terminatae, ca. 4 mm longae et 1.5 mm latae. Tota planta aromatica, odoratissima, odorem camphori et pomorum suavissimum exspirans.

Species corollarum defectu imperfecte nota, ex exemplari unico descripta.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, in fissuris rupium graniticarum montis Sopa Dûrik ad tentoria aestiva Djezra, alt. ca. 3300 m. Legi 3. IX. 1910 (No. 1564).

S. Palaestina L. Judaea: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, inter rupes calcar. alt. ca. 400 m. 18. V. 1909. (No. 1616).

S. Kotschy i Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Mizurka prope Amadia, ad rupes calcar. alt. ca. 850 m. 22. VI. 1910 (No. 1532).

S. lavandulaefolia Vahl. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, ad rupes calcar. alt. 2300—2500 m. 25. VII. 1910 (No. 1516). Distr. Hakkiari: mons Dwile supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in fissuris rupium granit. alt. ca. 200 m. 18. VI. 1910 (No. 1494).

S. annua L. var. Cilicica Boiss. *Folia inferiora* basi cordata. Armenia Turcica: in agris ad oppidum Malatia, leg. Fr. Anastase Cadell. (No. 1498).

S. melampyroides Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotam . . . p. 415]. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in agris alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 1575); ad pagum Baba Ğiğik eiusdem dit., in graminosis alt. ca. 700 m. 21. V. 1910 (No. 1576).

S. burgsdorffioides Boiss. ssp. ladanooides Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti, l. c. pag. 417.] Kurdistaniae Turcicae distr. Bervari: ad pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašîtha, in agris alt. ca. 1000—1200 m. 15. VI. 1910 (No. 1512 et 1522). Ad pagum Mâr Jakub prope pagum Simel dit. Môşul, in graminosis aridis alt. ca. 700 m. (Forma nana, caulis simplicibus 4—7 cm altis). 10. VI. 1910 (No. 1504).

S. neurocalycina Boiss. Galilaea: 'Ain Tabra (Et-Tabira) prope Tiberiadem, in graminosis alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 1701). Judaea; ad pagum Latrûm dit. Hierosolymorum, in agris alt. ca. 300 m. 3. IV. 1909 (No. 1631). Palaestina borealis: supra pagum Bâniás (Caesarea Philippi), in graminosis alt. ca. 700 m. 26. IV. 1909 (No. 1686).

Lamium striatum Sibth. et Sm. var. *reniforme* (Montb. et Auch.) Boiss. *Kurdistania Persica*: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širin, in lapidosis ad nives alt. ca. 1800 m. 5. V. 1910 (No. 1485, forma tomentosa). *Kurdistaniae Turcicae distr.* Ramorân: Halakur-Dar, ad septentr. ab oppido Ğeziret-ibn-Ômar, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2500 m (forma *glabra*). 25. VII. 1910 (No. 1600); distr. Berwari: traiectus supra pagum Aradêr dit. Amadia, in humosis subhumidis alt. ca. 1500 m (forma *puberula*), 15. VI. 1910 (No. 1593).

L. amplexicaule L. *Kurdistania Persica*: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Širin, in graminosis alt. ca. 1400 m. 5. V. 1910 (No. 1588).

Lamium Hakkiarensse Nábélek sp. nova. [Tab. IV, fig. 2, pag. 70, fig. 21.] Sect. *Lamiotypus* Boiss. *Perennis, caudiculis tenuibus, subterraneis, repens. Caules 10—20 cm alti, ascendentis, inferne glabri, superne molliter breviter hirtelli, quadranguli, angulis obtusis, plerumque purpurascentes. Folia omnia, floralibus non exceptis, petiolata, petiolis foliorum inferiorum longis, laminae longitudine usque ter longioribus, superiorum laminae longitudinem aequantibus aut subaequantibus, florarium ea duplo brevioribus. Lamina foliorum infimorum parva, cordata, rotundata usque reniformis, superiorum cordato-ovata, acuta, regulariter crenata, crenis utrimque 8—10, acutis, in utraque facie inferiora parcis, superiora densius molliter hirsuta, viridia, maxima ca. 2 cm longa et aequilata, floralia flores aequantia. Verticillastria 1—3, remota, 6—12-flora. Bracteae anguste linear-lanceolatae, dense hirsutae, calycis tubum dimidium aequantes, ca. 5 mm longae. Calyx dense patentim albido-hirsutus, tubo ca. 6 mm longo, dentibus triangulari-lanceolatis, longe acuminatis, acutis, muticis, ca. 4 mm longis, dense et longiuscule albo-hirsutis. Calyx post anthesin modice accrescens nondum maturus ca. 13 mm longus. Corollae albae, ca. 25 mm longae, tubus violaceo-suffusus, fere rectus, supra annulum obliquum abrupte saccatus, fauce subampliata, glaber, ca. 13 mm longus. Labium superum falcatum, apice truncatum, ca. 12 mm longum, extus longe albo-hirsutum et ciliatum. Lobi laterales denticulo subulato brevissimo aucti, mediis brerissime siipitatus, bifidus, absote crenulatus, ca. 5 mm longus et 7 mm latus. Nucula ignota.*

Lamio tomentoso Willd. (*vestito* Benth.) affine esse videtur, a quo differt corolla alba nec rosea, tubo longiore, calycis dentibus tubo subduplo brevioribus nec eo subbrevioribus, foliis brevioribus et latioribus, crenis pluribus maioribus acutioribus, indumento totius plantae et imprimis calycis densiore.

Crescit in *Kurdistaniae Turcicae distr.* Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter Hašîtha et Šattak, in humosis ad nives alt. ca. 2750 m. 28. VII. 1910 (No. 1557).

L. moschatum Mill. *Judaea*: ad pagum Beit Ğemal dit. Hierosolymorum, in saepibus alt. ca. 500 m. 6. IV. 1909 (No. 1692).

Molucella laevis L. *Judaea*: ad pagum Bittir dit. Hierosolymorum, in agris alt. ca. 700 m, 3. VI. 1909 (No. 1643a); El-Kubebe (Emaus), alt. ca. 750 m, 26. VII. 1909 (No. 1643). *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): ad pagum Tell Kef (Tell-is-Kof) dit. Môşul, in agris alt. ca. 350 m, 6. VI. 1910 (No. 1505); ad pagum Chandûk inter Hassan Kef (Hisn Keifa) et S'ert, in agris derelictis alt. ca. 450 m, 11. VII. 1910 (No. 1577); ad pagum Mâr Jakub prope S'ert, in steppa alt. ca. 900 m, 12. VII. 1910 (No. 1530), ad pagum Mâr Goria eiusdem ditionis, in agris alt. ca. 950 m, 16. VII. 1910 (No. 1470). *Armenia Turcica*: ad oppidum Malatia, in agris alt. ca. 1100 m legit Fr. Anastase Cadell. (No. 1487).

Ballota undulata (Fresen.) Bth. *Judaea*: Jericho, inter sepes alt. ca. -250 m, 19. et 31. III. 1909 (No. 1642 et 1645). 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, inter rupes alt. ca. 450 m, 18. V. 1909 (No. 1688).

B. saxatilis Sieb. *Judaea*: ad pagum Bittir dit. Hierosolymorum, in saxosis alt. ca. 700 m, 3. VI. 1909 (No. 1659).

Otostegia Kotschy Boiss. *Persia australis*: Kuh Chormûg dit. Bušîr (Abu Šehr), ad pagum Hawize, in rupestribus, 20. II. 1910 (No. 1537).

Phlomis Bruguierii Desf. f. *angustifolia* Bornm. *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): in steppis inter Kerkuk, Altunköprü et Erbil (Arbela) frequens alt. ca. 250—400 m, 17. V. 1910 (No. 1500); inter pagos Tell Kef (Tell-is-Kof) et Malta, in steppis alt. 300—400 m frequens, 6. VI. 1910 (No. 1475); inter Hassan Kef (Hisn Keifa) et S'ert, in steppis alt. 400—600 m (f. *latifolia*). 12. VII. 1910 (No. 1579).

P. Orientalis Mill. *Kurdistania Turcica* (*Assyria*): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, inter frutices alt. ca. 1000 m, 9. VI. 1910 (No. 1534); in valle Gabenerik inter pagos 'Ain Nûne et Amadia, in fruticetis alt. ca. 900 m, 22. VI. 1910 (No. 1525).

P. Orientalis Mill. var. *brachyodon* Boiss. *Judaea*: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, inter rupes alt. ca. 450 m, 18. IV. 1909 (No. 1646). Moab: in steppis ad Wâdi Môğib (Arnon), alt. 800—900 m, 12. VI. 1909 (No. 1669); ad Rabba (Rabbath Ammon), alt. ca. 900 m (? non florens), 13. VI. 1909 (No. 1655a).

P. Orientalis Mill. var. *nova cordifolia* Nk. [Fig. 20, pag. 65.] *Tota dense floccoso-lanata albida. Caules elati, usque 60 cm alti, firmi, recti. Folia omnia, floralibus exceptis, late ovata, obtusa, profunde cordata, maxima usque 10 cm longa et 7 cm lata, sinu usque 1.5 cm profundo. Folia floralia infima cordata, superiora basi truncata ovato-oblonga, et tandem basi cuneata, etiam summa petiolata. Flores submaiores, usque 3.5 cm longi, corolla pallide flava, calycis ca. 15—16 mm longi dentes tubo ca. triplo breviores.*

Palaestina Orientalis (Gilead): ad pagum Mâdaba, in humosis in steppa alt. ca. 700 m, 10. VI. 1909 (No. 1668).

P. brevilabris Ehrenb. *Armenia Turcica*: ad oppidum Malatia legit Fr. Anastase Cadell. (No. 1486).

P. Armeniaca Wild. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 1900 m. 1. VIII. 1910 (No. 1555).

P. Armeniaca Willd. var. *subcordata* Bornm. *Kurdistania Turcica* (Assyria): ad pagum Salahije (Kifri) dit. Hanikin, ad rupes gypsac. Šéch Zoar, alt. ca. 350 m. 10. V. 1910 (No. 1463).

P. aurea Decaisn. Moab: Rabba (Rabbath Ammon), inter rupes alt. ca. 900 m, 13. VI. 1909 (No. 1655 ?, non florens). *Arabia Petraea*: Ĝebel Hárûn (Hor) supra Wâdi Mûsa (Petra), ad rupes arenaceas alt. ca. 1200 m. 19. VI. 1909 (No. 1641).

P. viscosa Poir. *Judea*: Beit Ĝemâl prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 500 m. 6. IV. 1909 (No. 1673).

P. rigida Labill. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Berwari: ad pagum Mongeš in valle Sapna inter Amadia et Zacho (Azach), in graminosis alt. ca. 700 m. 23. VI. 1910 (No. 1520).

P. pungens Willd. [= *P. Herba-Venti* L. var. *tomentosa* Boiss.] *Galilaea*: Planities Esdrelon, ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) inter Nazareth et Ĝennîn, in graminosis. 3. V. 1909 (No. 1678).

Phlomis seticalycina Nábělek sp. nova. [Fig. 21, pag. 70.] Sect. *Euphlomis* Bth. *grex Oxyphlomides* Bth. *Caules herbacei, erecti, 40—50 cm alti, divaricatim et opposite paniculato-ramosi, quadranguli, angulis obtusissimis, lateribus sulcatis, pube stellata brevissime tomentelli et præterea pilis longis, rigidis, patentibus parce setulosi. Folia infima ignota, caulina oblongo-lanceolata, inferiora basi rotundata, superiora cuneata, acuta, crenata, inferiora longe, superiora brevius-petiolata, petiolis usque 5 cm longis, supra canaliculatis, basibus dilatatis lateraliter connatis, lamina usque 12 cm longa et 6 cm lata, in pagina superiore parcissime pilosa, nitida, pallide viridis, nervis subcanaliculatis percursa, in pagina inferiore pube stellata, brevi, densa canescens, nervis prominulis. Folia floralia inferiora basi cuneata, breviter petiolata, flores plus duplo superantia, ca. 5 cm longa et 2 cm lata, summa diminuta, verticillastro summo abortivo axim terminantia. Verticilla stra 2—3, omnia longe (3—5 cm) distantia, 10—15-flora. Bracteae subulatae, rigidae, basi sursum curvatae, calycis tubum superantes, ca. 15—17 mm longae, præter pubem tenuissimam stellatam setosae, setis albis patentibus, e tuberculo albo orientibus, usque fere 2 mm longis. Calycis subsessilis tubus rectus, brevissime stellatim-pubescentis, ca. 10 mm longus, decemnervius, nervis carinatim prominentibus, setis patentibus eis bractearum similibus vestitis. Dentes subpatentes, basi breviter triangulati, carinati, abrupte attenuati, subulati, in mucronem tenuem subpungentem abeuntis, inferiores ca. 7 mm, superiores ca. 4 mm longi, bractearum modo setosi. Corolla rosea, ca. 2 cm longa, extus pube stellata tomentella, tubo calyce duplo longiore, intus hirsuto et supra medium piloso-annulato, labio superiore breviter bifido, bicarinato, dente obtuso in utroque latere aucto. labii inferioris lobis lateralibus parvis, centrali*

ovato, acutiusculo, ad basin barbellato. Filamentis basi barbellatis, antheris subexsertis. Nuculis nondum maturis nigris, linearis-oblongis, trigonis, glabris, ca. 6 mm longis et 2 mm latis.




Fig. 21.

Det. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Lamium Hakkiarensis* Nk. (ca. $\frac{2}{1}$). 2. *Phlomis seticalycina* Nk. (ca. $\frac{3}{1}$).
3. *Teucrium palmatum* Nk. (ca. $\frac{3}{1}$).

Ex affinitate *Phlomidis Herbae-Venti* L. et *Phlomidis pungentis* Willd. esse videtur, sed ab utraque foliorum pagina superiori nitida, et imprimis bracteis et calycibus setosis distincta.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: in valle torrentis Kamarakab inter pagos Hoz et Šattak, in humosis subhumidis alt. ca. 1900 m. Legi 31. VII. 1910 (No. 1599).

P. tuberosa L. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in humosis alt. ca. 1800—1900 m. 31. VI. 1910 (No. 1479 et 1608).

Eremostachys laciniata (L.) Bge. Palaestina orientalis (Gilead): in steppis inter 'Ammân (Rabath Ammon) et fluv. Jabok, alt. ca. 900 m. 17. IV. 1909 (No. 1648). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Siares prope pagum Hašîtha dit. Ĝulamerik. in humosis alt. ca. 1700 m. 19. VI. 1910 (No. 1519).

Prasium maius L. Judaea: ad pagos Bêt Ĝemâl et Artuf dit. Hierosolymorum, inter saepes et in lapidosis alt. 450—600 m. 6. IV. 1909 (No. 1675 et 1693).

Ajuga oblongata M. B. Mesopotamia: Kasr Naķib prope Barđâd, ad limum in fossis et alveis. 27. IV. 1910 (No. 1629).

A. Chia (Poiret) Schreb. Armenia Turcica: in agris ad oppidum Malatia, alt. ca. 1100 m. legit F. Anastase Cadell (No. 1483).

A. Chia (Poir.) Schreb. var. *sufrutescens* Boiss. Judaea: Wâdi ed-Ĝôz prope Hierosolyma, in rupestribus alt. ca. 700 m. 24. III. 1909 (No. 1695).

A. tridactylites Ging. [= *Ajuga Chia* var. *tridactylites* Boiss.] Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Kāsr-i-Širîn, ad terram nudam alt. ca. 1000 m. 5. V. 1910 (No. 1585).

A. laevigata (Russ.) Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 m. 1. VIII. 1910 (No. 1561).

Teucrium multicaule Montb. et Auch. Armenia Turcica: ad oppidum Maſatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 1481).

T. orientale L. Armenia Turcica: in valle fluv. Chôšab (Šamiram-Su) prope pagum Chôšab dit. Wan, in marginibus agrorum et ad vias alt. ca. 1900 m. 9. IX. 1910 (No. 1449).

T. Orientale L. var. *glabrescens* Hausskn. [Bornmüller, Beitr. z. Fl. von Syrien u. Palaestina, Verhandl. zool.-botan. Ges. Wien, XLVIII (1898), p. 624.] Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Goria dit. S'ert, in agris alt. ca. 1200 m. 16. VI. 1910 (No. 1529).

T. Taylori Boiss. Persia australis: in agris ad pagum Ahrâmi dit. Bušîr (Abu Šehr). 16. II. 1910 (No. 1448).

T. Oliverianum Ging. Persia austro-occidentalis (Susiana): Cherr-e-Nemek in collibus Kuh Bejjât (Ĝebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem. 27. III. 1910 (nondum florens, No. 1452). Kurdistania Turcica (Assyria): Ĝebel Hamrîn inter Barđâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 180 m. 2. V. 1910 (No. 1450).

T. parviflorum Schreb. Palaestina: Planities Esdrelon inter Nazareth et Ĝenîn, in monticulis siccis. 6. V. 1909 (No. 1679).

Teuerium palmatum Nábělek sp. nova. [Tab. IV, fig. 1, pag. 70, fig. 21.] Sect. *Isotriodon* Boiss. ad interim. *E radice lignosa, pluricpite, cortice fusca obtecta, caudiculos tenues inter lapides repentes aut caules basi solum ramosos, ceterum simpliccs, steriles et floriferos, caespitosos, basi induratos, edens, Caules 6—10 cm alti, procumbentes et ascendentes, basi indurata fusi, dense et molliter, sursum densius et longius, lanatuli, obtuse quadranguli, crassiusculi, basi indurata excepta foliosi, verticillastris plerumque bifloris, congestis, spicam ovatam formantibus, terminati. Folia caulium floriferorum inferiora et ea caulium sterilium longe petiolata, petiolis laminae longitudinem superantibus, supra canaliculatis, infra subcarinatis, molliter lanatulis et hic inde glanduloso-punctatis, cetera breviter petiolata, ambitu ovato-orbiculata, basi cordata, profunde crenato-lobata, fere palmata, lobis ovato-oblongis, obtusis in utroque latere 4, in pagina superiore dense, in pagina inferiore parcis cinereo-lanatula et praeterea parce glanduloso-punctata, nervis parcis supra canaliculatis, subtus prominentibus, percursa, ca. 8 mm longa et aequilata aut paullo latiora. Folia floralia obovata, basi longiuscule cuneata, prorsus crenato-lobata, lobis obtusis 6—8, calyces subaequantia. Bracteae numerosae, oblongae, basi longe attenuatae, trinerviae, apice mucronulatae, molliter villosulae, purpureae, longae, calycis tubum subsuperantes, ca. 10 mm longae et 2 mm latae, alterae breviores, summae minimae ca. 4 mm longae, anguste lineares, fere subulatae. Calycis subbilabiati, purpurei, molliter villosi et parce glanduloso-punctati, tubus 6—8 mm longus, subgibbus, 15-nervius, dentes praesertim in margine, sed etiam extus et parce etiam intus molliter albo-villosi, tres superiores ovati, acuti, trinervii, mucrone brevi terminati, medio lateralibus latiore et sublongiore, ca. 4 mm longo, dentes duo inferiores lanceolati, acuti, trinervii, mucronati, ca. 5 mm longi. Sinus inter dentes superiores et inferiores brevissime extrorsum revoluti et (an semper?) setas villosulas dentibus dimidio breviores gerentes. Corolla ignota. Nuculae oblongae, subtrigonae, basi attenuatae, apice acutiusculae, leves, fuscae.*

Species propter corollarum defectum imperfecte nota. Crescit in Kurdistaniae Turcicae districtu Hakkiali, in fissuris rupium graniticarum montis Sopa Dûrik in montibus Čelo-Dar dit. Čulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, alt. ca. 3000 m. Legi 3.IX. 1910 (No. 1563).

T. Chamaedrys L. Armenia Turcica: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 1488).

T. divaricatum Sieb. Judaea: ad pagum Beit Šemal dit. Hierosolymorum. In saxosis alt. ca. 600 m. 6.IV. 1909 (No. 1691); ad Hebron, inter rupes alt. ca. 800 m. 27.V. 1909 (No. 1662). Mons Karmel, ad rupes alt. ca. 300—500 m, var. *villosum* Čelak. [Čelakovský, Botan. Centralbl. XIV.], 2. V. 1909 (No. 1651). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môsul, forma *pruinosa* m.

brevisime crispule hirtella et pruinosa, pilis longis spec. typ. carens., ad rupes calcar. alt. ca. 1100 m. 8. VI. 1910 (No. 1506).

T. Polium L. var. vulgare Boiss. Judaea: ad pagum Beit Šemâl dit. Hierosolymorum, in rupestribus alt. ca. 500 m frequens. 7. IV. 1909 (No. 1676). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia, leg. Fr. Anastase Cadell (No. 1482). Kurdistania Persica: infra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, ad rupes alt. ca. 900 m, forma **breviceulis** m., *caulibus* 9—10 cm altis, *decumbentibus et ascendentibus*, *tenuiter tomentosa*, *cano-viridis*, *foliis non revolutis*, *parvis*, *maximis ca. 1 cm longis et 0·5 cm latis*, *in utraque facie tenuiter tomentellis*, *cano-viridibus*, *concoloribus*, *inflorescentii minus ramosis*, *caulium ramis plerumque capitulis tribus fere confluentibus terminatis*, *corollis albis*. 6. V. 1910 (No. 1589). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: colles aridi ad pagum Baba Ĝigik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 1628).

T. Polium L. var. *angustifolium* Bth. Kurdistania Turcica (Assyria); Šebel Kumataš (Hamrîn) inter Baṛdâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 250 m. 3. V. 1910 (No. 1623). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Bestabîje prope pagum Hoz inter Hašîtha et Šattak, ad rupes alt. ca. 1600 m. 30. VII. 1910 (No. 1606). Persia australis: Kuh Chormûğ dit. Bušîr (Abu Šehr), ad rupes prope cacumen montis. 19. II. 1910 (No. 1536).

T. Sinaicum Boiss. Arabia Petraca: Šebel Hârûn (Hor) supra Wâdi Mûsa (Petra), ad rupes arenaceas alt. ca. 1000 m. 18. VI. 1909 (No. 1543).

Index generum.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Acanthaceae</i> 38 | <i>Cyclamen</i> 9 | <i>Lycopus</i> 41 |
| <i>Acanthus</i> 39 | <i>Cynanchum</i> 11 | <i>Lysimachia</i> 9 |
| <i>Ajuga</i> 71 | <i>Cypomatia</i> 24 | |
| <i>Alkanna</i> 22 | | Mandragora 26 |
| <i>Amaracus</i> 41 | Daemia 11 | <i>Marrubium</i> 58 |
| <i>Anagallis</i> 9 | <i>Datura</i> 26 | <i>Marsdenia</i> 12 |
| <i>Anarrhinum</i> 30 | <i>Dionysia</i> 9 | <i>Mattia</i> 24 |
| <i>Anchusa</i> 18 | | <i>Melissa</i> 46 |
| <i>Anoplanthus</i> 37 | <i>Echinospermum</i> 22 | <i>Mentha</i> 40 |
| <i>Antirrhinum</i> 31 | <i>Echiochilon</i> 21 | <i>Michauxia</i> 3 |
| <i>Apocynae</i> 10 | <i>Echium</i> 21 | <i>Micromeria</i> 44 |
| <i>Apocynum</i> 11 | <i>Eremostachys</i> 71 | <i>Moltkia</i> 22 |
| <i>Arbutus</i> 9 | <i>Erica</i> 9 | <i>Molucella</i> 68 |
| <i>Arnebia</i> 21 | <i>Ericaceae</i> 9 | <i>Myosotis</i> 22 |
| <i>Asclepiadaceae</i> 11 | <i>Erythraea</i> 12 | |
| <i>Asperugo</i> 24 | <i>Euphragia</i> 35 | Nepeta 53 |
| <i>Asterolinum</i> 9 | <i>Euphrasia</i> 35 | <i>Nerium</i> 10 |
| <i>Asyneuma</i> 7 | | <i>Nicotiana</i> 26 |
| <i>Avicennia</i> 40 | Fraxinus 10 | <i>Nonnea</i> 18 |
| | | |
| <i>Ballota</i> 68 | <i>Gentiana</i> 12 | <i>Ocimum</i> 40 |
| <i>Bartsia</i> 35 | <i>Gentianae</i> 12 | <i>Odontites</i> 36 |
| <i>Blackstonia</i> 12 | <i>Globularia</i> 39 | <i>Oleaceae</i> 10 |
| <i>Blepharis</i> 38 | <i>Gomphocarpus</i> 11 | <i>Onosma</i> 19 |
| <i>Borragineae</i> 15 | | <i>Origanum</i> 41 |
| <i>Brunella</i> 58 | Heliotropium 16 | <i>Orobanchaceae</i> 37 |
| <i>Bungea</i> 35 | <i>Hyoscyamus</i> 26 | <i>Orobanche</i> 37 |
| | | <i>Orthantha</i> 36 |
| <i>Caccinia</i> 24 | <i>Jasminum</i> 10 | <i>Ostostegia</i> 68 |
| <i>Calamintha</i> 45 | | |
| <i>Calotropis</i> 11 | Kickxia 31 | Paracaryum 23 |
| <i>Campanula</i> 3 | | <i>Parentucellia</i> 35 |
| <i>Campanulaceae</i> 3 | <i>Labiatae</i> 40 | <i>Pedicularis</i> 37 |
| <i>Celsia</i> 29 | <i>Lallemantia</i> 57 | <i>Pentatropis</i> 11 |
| <i>Centaurium</i> 12 | <i>Lamium</i> 67 | <i>Periploca</i> 11 |
| <i>Cerinthe</i> 18 | <i>Lappula</i> 22 | <i>Phelipaea</i> 37 |
| <i>Cistanche</i> 38 | <i>Lavandula</i> 40 | <i>Phlomis</i> 68 |
| <i>Clinopodium</i> 46 | <i>Leptadenia</i> 12 | <i>Physalis</i> 25 |
| <i>Convolvulaceae</i> 13 | <i>Limnanthemum</i> 12 | <i>Podanthum</i> 7 |
| <i>Convolvulus</i> 13 | <i>Linaria</i> 30 | <i>Podonosma</i> 21 |
| <i>Cordia</i> 15 | <i>Lippia</i> 39 | <i>Prasium</i> 71 |
| <i>Cressa</i> 15 | <i>Lithospermum</i> 22 | <i>Primulaceae</i> 9 |
| <i>Cuscuta</i> 15 | <i>Lycium</i> 25 | <i>Primula</i> 10 |

Rhododendron	9	Sideritis	60	Thymus	41
Rhyncocorys	36	Solanaceae	25	Trachelioopsis	8
Rindera	24	Solanum	25	Trichodesma	25
Rochelia	22	Solenanthus	24	Trixago	35
Salvia	47	Specularia	8	Verbascum	26
Salvadora	10	Stachys	61	Verbena	39
Samolus	9	Styrax	10	Veronica	33
Satureia	44	Sweertia	13	Vitex	39
Scrophularia	32	Symphytum	19	Withania	25
Scrophulariaceae	26	Tapeinanthus	57	Zataria	43
Scutellaria	57	Teucrium	71	Ziziphora	46
Sesamum	13	Thymbra	43		



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Campanula eo-cervicaria* Nk. 2. *Asyneuma lobelioides* (Willd.) Hand.-Mzt. var. *filipes* Nk. 3. *Heliotropium ferrugineo-griseum* Nk. 4. *Rhynchosciurus kurdicus* Nk.



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Verbascum Anastasii* Nk. 2. *Verbascum pseudo-Digitalis* Nk. 3. *Campanula Bornmülleri* Nk.



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Marrubium vulgare* L. var. *gossypinum* Nk. 2. *Stachys odoratissima* Nk. 3. *Zizyphora Bonningeri* Nk.

4. *Antirrhinum Ceratotheca* Nk. 5. *Stachys graveolens* Nk. f. *congesta* Nk.



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Teucrium palmatum* Nk. 2. *Lamium Hakkiarensis* Nk. 3. *Salvia candidissima* Vahl.
var. *cordifolia* Nk.



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

Salvia albifrons Nk.



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Nepeta iodantha* Nk. 2. *Satureia flacca* Nk. 3. *Thymus Kotschyanus* Boiss. et Hoh.
var. *Nábělekianus* Ronn. 4. *Paracaryum Luristanicum* Nk.



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Nepeta Mussini* Henk. var. *albiflora* Nk.
2. *Stachys glechomaefolia* Nk.
3. *Stachys graveolens* Nk.
4. *Nepeta purpurea* Nk.
5. *Veronica gentianoides* Vahl. var. *glacialis* Nk.
6. *Asyneuma lobelioides* (Willd.) Hand.-Mzt. var. *capitatum* Nk.

51. J. SAHÁNEK: Výklad vzniku krátkých elektromagnetických vln v elektro-nových lampách. (An Explanation of the Origin of short electromagnetic Waves in Valves.)
52. F. NÁBĚLEK: Iter Turcico-Persicum. Pars II: Plantarum collectarum enumeratio (Compositae).
53. V. MORÁVEK: La valeur osmotique et la réaction actuelle de l'eau du Golfe de Villefranche, à quel point sont elles constantes?
54. V. TEYROVSKÝ: Studie o inteligenci kočky II. (Studies on the Intelligence of the Cat.)
55. J. SUZA: Nástin zeměpisného rozšíření lišejníků na Moravě vzhledem k poměrům evropským. (A Sketch of the Distribution of Lichens in Moravia with Regard to the Conditions in Europe.)
56. G. ŠIRJAEV: Onobrychis generis revisio critica. Pars prima.
57. V. TEYROVSKÝ: Studie o larvách Corixid I. (Études sur les larves des Corixides I.)
58. J. ŠVÁBENÍK: Parasitismus a metamorfosa druhu *Gordius tolosanus*. (Parasitism and Metamorphosis of the Species *Gordius tolosanus* Duj.)
59. V. MORÁVEK: O růstových útvarech vznikajících reakcemi na rozhraní mezi roztoky elektrolytů ve vodě a v gelu. (On the growth of structures formed by reactions on the boundary between solutions of electrolytes in water and those in gel.)
60. J. FREJKA a A. VŠETEČKA: Příspěvek ku kvantitativnímu stanovení kyseliny mléčné. Mikromethoda ku stanovení v krvi. (Recherches sur le dosage de l'acide lactique. Le microdosage dans le sang.)
61. A. ŠIMEK a H. KADLOVÁ: Nový zjev elektrokinetický. Příspěvek ke studiu elektrokapilarity roztaveného kysličníku telluričitého. (Un nouveau phénomène électrocinétique. Étude de l'électrocappillarité de l'oxyde tellureux fondu.)
62. Fr. ŘÍKOVSKÝ: *Rhamphorhynchus Gemmingi*. H. v. Meyer.

63. V. ČUPR: O absorpci plynného chlorovodíku v kyselině sírové. (The absorption of gaseous hydrogen chloride by sulphuric acid.)
64. Fr. KOLÁČEK: Oblastní odtoková mapa Moravy. (Carte géographique du débit d'eau relatif de la Moravie.)
65. J. ZAVŘEL: »Tanytarsus connectens«.
66. Fr. VITÁSEK: Morfologický vývoj Hlučínska. (The morphological development of Hlučín.)
67. Fr. ŘÍKOVSKÝ: Terasy dolní Svitavy a dolní Svratky. (Les terrasses de la Svitava inférieure, et de la Svratka inférieure.)
68. V. ČUPR: O absorpci chlorovodíku a kysličníku siřičitého v kyselině sírové a v kyselině octové. [Pokračování.] (On the absorption of hydrogen chloride and sulphur dioxide in sulphuric acid and acetic acid.) [Continuation.]
69. J. KLAPKA. O W-kongruencích s fokálními plochami přímkovými. (Sur les congruences *W* dont les surfaces focales sont réglées.)
70. F. NÁBĚLEK: Iter Turcico-Persicum. Pars III: Plantarum collectarum enumeratio.

Seznam sešitů 1—50 zašle na požádání Přírodovědecká fakulta
(Brno, Kounicova 63).

Pour le catalogue des fascicules 1—50 s'adresser à la Faculté des Sciences
(Brno, Kounicova 63).